

DELTA AGRAR

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA



**KATALOG
PROIZVODA**

DELTA AGRAR

KATALOG PESTICIDA

www.deltaagrar.rs

Delta Agrar d.o.o.
Vladimira Popovića 8A
11070 Novi Beograd
tel: 011/201 2433, 201 2348

Distributivni centar Futog
Železnička 17
21410 Futog
tel: 021/895 483

Distributivni centar Čačak
Ibarski put bb
32212 Preljina
tel: 032/5377 750

Distributivni centar Kruševac
Mike Stojanovića 7
37000 Kruševac
tel: 037/418 760, 417 750

DIREKTOR PROGRAMA

Lazar Bijelić
lazar.bijelic@deltaagrar.rs

PRODAJNI TIM**BAČKA:**

Milan Gulić
milan.gulic@deltaagrar.rs

Marko Kovačević
marko.kovacevic@deltaagrar.rs

Vasilje Buča
vasilje.buca@deltaagrar.rs

BANAT:

Gerasim Mladenovski
gerasim.mladenovski@deltaagrar.rs

SREM I MAČVA:

Marko Bulović
marko.bulovic@deltaagrar.rs

STRUČNA SLUŽBA VOJVODINA

Dragana Vučković
dragana.vuckovic@deltaagrar.rs

Marija Đogić
marija.djogic@deltaagrar.rs

**ZAPADNA SRBIJA I MAČVA:**

Slobodan Knežević
slobodan.knezevic@deltaagrar.rs

Đorđe Pešić
djordje.pesic@deltaagrar.rs

CENTRALNA SRBIJA:

Goran Milošević
goran.milosevic@deltaagrar.rs

Vladan Todosijević
vladan.todosijevic@deltaagrar.rs

SADRŽAJ

HERBICIDI	9	METTO	50
ADENGO®	10	MISTRAL®	52
AGIL®	12	MONSOON® ACTIVE	54
ARIGO®	13	NICOGAN®	56
BETANAL® TANDEM®	14	PULSAR® 40.....	57
BETASANA SC	16	PRINCIPAL® PLUS	58
BOXER	18	RACER®.....	60
BIATHLON® 4D.....	20	SELECT® SUPER	61
CHIEF®	21	SALTUS®	62
CORUM®	22	SEKATOR OD	64
COLTRANE®	24	STRIM	66
CORNISTO PRO®	25	SUHOY	68
EFICA®	26	STOMP® AQUA.....	69
LISTEGO®	27	TRIFARI WG-50.....	70
FUSILADE FORTE®	28	TBM 75 WG.....	72
FOCUS® ULTRA	30	VIBALLA™ EC.....	74
FRONTIER® SUPER	31	FUNGICIDI	77
GARDOPRIM® PLUS GOLD 500 SC	32	AMISTAR® PRIME PACK	78
GOLTIX® GOLD.....	34	AXIDOR	79
IMAZOFIL 40 SL	36	CHORUS 50 WG	80
LAUDIS®	38	CUPROXAT®	82
LUMAX® 537,5 SE	40	BLAUVIT	84
METAFOL SUPER	42	DELAN® PRO	85
MUSTANG™ FORTE	44	DUETT® TURBO.....	86
METAFOL 700 SC.....	45	FALCON FORTE	88
METRIKS 600 SC	46	FABAN®	89
MILAGRO® PLUS.....	48		

FORUM® STAR.....	90
GALICAP	91
PICTOR®	92
REVVIT®	93
PRIAXOR®	94
PROPULSE® 250 SE	95
PROFILER®	96
REVCARE®	98
SERCADIS®	100
NEORAM® 37,5 WG	101
QUADRIS®	102
VIVANDO®	104
CYFLAMID 5 EW	105
UNIVOQ™	106

INSEKTICIDI.....	109
ASHETA	110
KRAFT 1.8 EW	111
DECIS® EXPERT	112
INVERT® EW.....	114
MEGATHRIN 2,5 EC	116
MOSPILAN® 20 SG.....	117
RADIANT™ 120 SC.....	118
SOILGUARD 1,5 GR	119

AKARICIDI	121
NISSORUN® 10 EC	123

REGULATORI RASTA.....	125
CYCOCEL® 750	126
BREVIS®	127
TRIMAXX®	128

OKVAŠIVACI	131
MAGIS	132
DASH®	133
ELASTIQ® ULTRA	134

SPECIJALNI PROGRAM.....	137
BIOSTIMULATORI	139
EXELGROW®	140
FOLICAL	142
FORTHIAL	144
MULTOLEO	146
ROOTER	148
BM START	150
ZEAL	152
OLIGO BORON	153
ARY- AMIN C®	154

PRILOZI	156
PRAKTIČNI SAVETI ZA PRIMENU PESTICIDA ...	156
PRAVILNIK ZA PRUŽANJE MERA	
PRVE POMOĆI.....	159
PIKTOGRAMI ZA OBELEŽAVANJE PREPARATA... 160	
SMERNICE ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽOM	
OD HEMIJSKIH SREDSTAVA.....	161

HERBICIDI

DELTA AGRAR

www.deltaagrar.rs

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJIA:

izoksaflutol 225 g/l + tienkarbazon-metil 90 g/l

Preparat sadrži i protektant ciprosulfamid 150 g/l

PRIMENA:

ADENGO® je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Primenuje se u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 - 0,45 l/ha.

Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, na istoj površini.

SPEKTAR DELOVANJA:

ADENGO® uspešno suzbija više od 85 različitih vrsta travnih i širokolisnih korova, uključujući i najčešće korove u usevu kukuruza:

- Uskolisni korovi: divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*), proso korovsko – veliki muhar (*Echinochloa crus-galli*);

- Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), boca obična (*Xanthium strumarium*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), njivski vijušac (*Polygonum convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), tatula obična (*Datura stramonium*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*);

Zaustavlja dalji porast višegodišnjih korova, kao što su: palamida (*Cirsium arvense*) i poponac (*Convolvulus arvensis*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

ADENGO® sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivnu materiju i listom i korenom. Izoksaflutol dovodi do sprečavanja sinteze karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon – metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Odmah po usvajanju, tienkarbazon-metil se sprovodnim sudovima prenosi do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS), koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru. Ciprosulfamid, kao protektant, podstiče metabolizam kukuruza i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, ADENGO® se odlikuje izuzetnom selektivnošću.

NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati ukoliko je usev pod stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima).

Mešanje sa ostalim pesticidima:

ADENGO® se može mešati sa različitim tečnim đubrivima, ali samo ukoliko se primenjuje u periodu posle setve, a pre nicanja useva. Može se mešati sa drugim herbicidima, osim sa ES formulacijama u periodu posle nicanja kukuruza. Ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba ovog herbicida.

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz. Četiri meseca od primene preparata, posle dubokog oranja, mogu se sejati ozima pšenica i uljana repica.

Nema ograničenja u plodoredu kada su u pitanju jari usevi.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

200 ml, 1 L i 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

propakvizafop 100 g/l

PRIMENA:

Agil® je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se u velikom broju gajenih useva za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

U usevima suncokreta, soje, šećerne repe i crnog luka:

- Jednokratna primena - kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, u količini od 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ili 1 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova;
- Split aplikacija - prvo tretiranje izvršiti kada su korovi u fazi 3-5 razvijenih listova pa do početka bokorenja, a drugo tretiranje izvršiti dve nedelje posle prvog u količini: 0,4 + 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ili 0,5 + 0,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova;

U usevima krompira, graška, paradajza, šargarepe i kupusa:

- Jednokratna primena posle nicanja useva u količini 1 l/ha kada su korovi u fazi 3 lista

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/ha).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine u jednokratnoj ili split aplikaciji.

SPEKTAR DELOVANJA:

Uspešno suzbija sledeće korovske vrste: divlji sirak iz semena i rizoma (*Sorghum halepense*), plevina obična (*Agropyrum repens*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), svračica crvena (*Digitaria sanguinalis*), muhari (*Setaria spp.*).

NAPOMENE:

Ukoliko se u vreme primene i 48h nakon primene očekuju temperature iznad 25°C, visok je rizik od pojave fitotoksije (kovrdžanje lišća, zaustavljanje porasta, odumiranje tačke porasta, odbacivanje cveta). Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu svog razvoja, soja, grašak i paradajz koji su počeli da cvetaju, suncokret stariji od 8 listova koji ulazi u fazu butonizacije. Kod šećerne repe, krompira, mrkve, kupusa i crnog luka ovaj problem nije izražen.

KARENCA:

Suncokret, soja, šećerna repa, crni luk, krompir, paradajz, šargarepa i kupus - 30 dana;

Grašak - 40 dana.

PAKOVANJE:

1L i 5L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJAI:

mezotrion 360 g/kg + nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg

PRIMENA:

ARIGO® je herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom. Preporuka je da se preparat **ARIGO®** primenjuje kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12-18 BBCH skale) u količini: 330 g/ha + 0,1% okvašivača **Trend® 90**.

Spektar delovanja:

Preparat **ARIGO®** efikasno suzbija:

- višegodišnje uskolisne korove, kao što je divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*);
- jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: muhar sivi (*Setaria glauca*) i divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*);
- jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), tatula obična (*Datura stramonium*), suncokret divlji (*Helianthus annuus*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), krtolasti graor (*Lathyrus tuberosus*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*) i pomoćnica obična (*Solanum nigrum*);

Prednosti i napomene:

- Delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim tretmanom, u trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju glavni korovi koji utiču na smanjenje prinosa;
- Širok spektar delovanja na sve dominantne korove u kukuruza;
- Jedan tretman koji omogućava dovoljno vremena za sve druge radove;
- Superiorno delovanje sa malim količinama primene i visoka selektivnost preparata omogućava bezbedan usev;
- Delovanje preko lista i preko zemljišta.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

330g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



HERBICID

BETANAL® TANDEM®

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

fenmedifam 200 g/l + etofumesat 190 g/l

PRIMENA:

Betanal® Tandem® se primenjuje u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, trokratno u količini primene:

- U količini primene od 2,6 l/ha (260 ml/100 m²) - trokratna primena uz razmak između tretmana 5 - 10 dana: 1 l/ha + 0,6 l/ha + 1 l/ha ili 0,8 + 1 + 0,8 l/ha ili
- U količini primene od 4 l/ha (400 ml/100 m²) - trokratna primena: 1 l/ha + 1,5 l/ha + 1,5 l/ha pri čemu je razmak između prvog i drugog tretmana 5 – 9 dana, a između drugog i trećeg tretmana je 10 – 14 dana.

Ukupna količina primene je 4 l/ha. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova (faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Svaki sledeći tretman obaviti po pojavi novih ponika korovskih biljaka.

Utrošak vode je od 200 do 400 l/ha, a maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u vidu trokratne primene.

SPEKTAR DELOVANJA:

Širokolisni korovi: veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), tatula obična

(*Datura stramonium*), štir hibridni (*Amaranthus hybridum*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*);

Uskolisni korovi: muhar sivi (*Setaria glauca*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat **Betanal® Tandem®** je kombinacija dve aktivne materije – fenmedifam i etofumesat. Fenmedifam, koga korov usvaja listom, deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila. Ova aktivna materija deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

NAPOMENE:

- količinu primene treba prilagoditi prisutnim korovskim vrstama, a pri tretiranju nižim dozama, u svaki tretman uključiti partnerski preparat na bazi metamitrona u količini 1-1,25 kg/ha;
- kako bi se postigao još bolji efekat delovanja herbicida na korove, preporučujemo dodavanje okvašivača Mero sa svakim tretmanom;
- preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
- kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 - 3 dana;
- za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Betanal® Tandem® se može mešati sa preparati-
ma na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida,
fenoksaprop-p-etila radi delovanja na specifične
korovske vrste. Pre primene u mešavini sa dru-
gim preparatima treba napraviti probu mešanja.

KARENCA:

Šćерна repa – 90 dana.

PAKOVANJE:

5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Fenmedifam 160 g/l

PRIMENA:

BETASANA SC je selektivni folijarni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe posle nicanja useva i korova.

Primenjuje se:

Jednokratno: Kada je šećerna repa u fazi 4 razvijena lista (faza 14 BBCH-skale), a korovi su u fazi 2 – 4 lista. U količini od 6,0 l/ha (60 ml na 100 m²).

Dvokratno: Prvi tretman kada je šećerna repa u fazi kotiledona do 2 prava lista (faza 10 -12 BBCH-skale), a korovi su u fazi do 2 lista. Drugi tretman 7 - 10 dana posle prvog tretmana. U količini od 3,0 + 3,0 L/ha (30 + 30 ml na 100 m²).

Trokratno: Prvi tretman nakon nicanja šećerne repe u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale), drugi tretman 5 – 10 dana nakon prvog tretmana i treći tretman 5 – 10 dana nakon drugog tretmana, a korovi su u fazi od kotiledona do prva 2 para razvijenih listova. U količini od 2,0 + 2,0 + 2,0 L/ha (20 + 20 + 20 ml na 100 m²).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²)

Ukupna količina primene je 6 l/ha u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Širokolisni korovi.

Jednokratna primena: u količini od 6,0 l/ha (60 ml na 100 m²).

Dobro suzbija: pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*).

Zadovoljavajuće suzbija: dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*).

Slabo suzbija: lipica Teofrastova (*Abutilon theophrasti*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), poponac obični (*Convolvulus arvensis*), vilina kosica (*Cuscuta* sp.), tatula obična (*Datura stramonium*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

Dvokratna primena: u količini od 3,0 + 3,0 L/ha (30 + 30 ml na 100 m²).

Zadovoljavajuće suzbija: pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*)

Slabo suzbija: lipica Teofrastova (*Abutilon theophrasti*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), poponac obični (*Convolvulus arvensis*), vilina kosica (*Cuscuta* sp.), tatula obična (*Datura stramonium*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

Trokratna primena: u količinama od 2,0 + 2,0 + 2,0 L/ha (20 + 20 + 20 ml na 100 m²).

Zadovoljavajuće suzbija: dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*).

Dobro suzbija: pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*).

Slabo suzbija: lipica Teofrastova (*Abutilon theophrasti*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), poponac obični (*Convolvulus arvensis*), vilina kosica (*Cuscuta* sp.), tatula obična (*Datura stramonium*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

BETASANA SC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid koji se usvaja preko lista. Inhibitor je fotosinteze (Fotosistem II). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 5(C1)

NAPOMENE:

Sprečiti zanošenje na susedne osetljive useve i zasade. Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;

Može se mešati sa herbicidima na bazi aktivnih materija: metamitron, etofumesat, triflusalufuronmetil i klopiralid radi šireg spektra delovanja.

Ukoliko dođe do preoravanja useva šećerne repe, na istim površinama može se ponovo sejati šećerna repa.

Nema ograničenja u izboru narednog useva. Pre setve narednog useva zemljište treba preorati na najmanje 20 cm dubine.

KARENCA:

Šećerna repa – 90 dana.

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

BETASANA SC
HERBICID

PRIMENA: BETASANA SC JE SELEKTIVNI FOLIJARNI, SISTEMIČNI HERBICID ZA SUZBIJANJE JEDNODODIŠNIH I VIŠEGODIŠNIH ŠIROKOLISNIH KOROVA U USEVU ŠEĆERNE REPE POSLE NICAŃA USEVA I KOROVA.

Herbicid SC – koncentrovana suspenzija
Sastav preparata (aktivna materija) sadrži: Fenmedam 160 g/l

Dovoljno za stavljanje u promet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj 323-01-0180/2022-11 od 04.03.2023. godine sa svim važnim izmenama i dopunama.

Preporučač: UPL Europe Ltd, Velika Branika
Zastupnik: TFS Morava d.o.o., Balkanska 29, Beograd, Srbija, tel: 011 406 16 82

Klasifikacija rezistentnosti HRAC:
Klasifikacija u skladu sa HRAC
Nek. imanje 5 godine
Datum prolevođenja i broj šarže: utisnuti na ambalazi
Distributer i uvoznik: Delta Agrar d.o.o., Vojvodina Popovica 26, Beograd, tel: 011 201 2300

UPL AGRAR

Obaveštenja o opasnosti
H317 – Može da izazove alergijsku reakciju na koži.
H319 – Dovedi do iritacije oka.
H411 – Opasno za vodene ekosisteme u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Obaveštenja o merama predostrobnosti
P273 – Izbegavajte odlaganje prašine/ima/gasova/maglavaparova.
P501 – Operite tace, podlatice i lice detaljno nakon rukovanja.
P272 – Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.
P273 – Izbegavajte ispuštanje/otpadanje u životnu sredinu.
P280 – Nositi zaštitnu odjevu i zaštitnu opremu za zaštitu od iritacije kože.
P501 – AKO DOĐE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
P103 – P103+P203: AKO DOĐE U OČI: Pažljivo ispirati odmah nekoliko minuta. Ukoliko kumulativna sočva, ukloniti preostali i isključiti je iz mogućeg učinka. Nastaviti sa ispiranjem.
P333+P313 – Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski pomoćnik/lekar.
P333+P313 – Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski pomoćnik/lekar.

Sve informacije o P272+P501 – Otkloni kontaminiranu odjevu i opremu pre ponovne upotrebe.
P280 – Svakog dana pranje ruku.
P501 – Odlaganje u zatvoreni i ambalazi u skladu sa nacionalnim propisima.
Dodatno obaveštenje o opasnosti
H411: Izbegavajte odlaganje u vodu.
Dodatne oznake opasnosti
GHS – Sprečiti nepoželjno vodu sredstvom za zaštitu bilja ili njegovim ambalazom. Izbegavajte zaštitu bilja ili čišćenje površine vode. Sprečiti zapaljenu odvodnu kanalu sa poljoprivrednih površina i puteva.
SP01: Prilikom primene sredstva za zaštitu bilja operati zaštitnu odjevu.

PAŽNJA!

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE PRATEĆEG UPUTSTVA I ETIKETE KAKO BI SE IZBEGLO REZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU!

5 L
NETO KOLIČINA

UPL

DELTA AGRAR

BOXER

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJIA:

kletodim 240 g/l

PRIMENA:

Boxer je selektivni sistemični herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korovskih vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

Primenjuje se u količini od 0,4, 0,6 i 1 l/ha (4, 6 i 10ml na 100 m²) posle nicanja useva i korova, kada su korovi u fazi 2-5 listova, a usev šećerne repe u fazi 2-6 listova (12-16 BBCH skale), odnosno usev suncokreta u fazi 3-5 listova (12-14 BBCH skale).

Boxer se primenjuje folijarno, prskanjem ili orošavanjem sa zemlje.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/100m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

U količini primene od 0,4l/ha (4ml/100m²):

Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz semena;

Zadovoljavajuće suzbija korov kao što je: pirevina obična (*Agropyrum repens*);

Slabo suzbija korove kao što su: zubača obična (*Cynodon dactylon*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz rizoma.

U količini primene od 0,6 l/ha (6ml/100m²):

Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz semena;

Zadovoljavajuće suzbija višegodišnje korove kao što su: pirevina obična (*Agropyrum repens*), zubača obična (*Cynodon dactylon*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz rizoma.

U količini primene od 1 l/ha (10ml/100m²)

Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz semena;

Dobro suzbija višegodišnje korove kao što su: pirevina obična (*Agropyrum repens*), zubača obična (*Cynodon dactylon*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz rizoma.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Boxer je herbicid iz grupe cikloheksanona. Apсорbuje se preko lista i translocira u korenov sistem i druge delove biljke. Inhibitor je sinteze masnih kiselina preko inhibicije CoA karboksilaze (ACC-aze).

NAPOMENE:

Niže količine sredstva primenjuju se na korove u ranijim fazama rasta. Najbolji rezultati postižu se primenom na korove u aktivnom rastu. Za efikasnije suzbijanje višegodišnjih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma.

Može doći do smanjivanja efikasnosti sredstva u nepovoljnim uslovima (suša, niske temperature).

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova, može se mešati sa fungicidima i insekticidima.

Pre mešanja sa drugim pesticidima, posebno različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Plodored:

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisni usevi, a 30 dana nakon tretiranja mogu se sejati uskolisne gajene biljke.

U normalnom plodoredu posle primene mogu se sejati svi usevi bez ograničenja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



BIATHLON® 4D

FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

tritosulfuron 714 g/kg + florasulam 54 g/kg

PRIMENA:

Biathlon® 4D se primenjuje folijarno u usevima ozime pšenice i ozimog ječma za suzbijanje najšireg spektra korova.

U usevima ozime pšenice se primenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova kada je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova. Količina primene je: 40-50g/ha;

U usevima ozimog ječma se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova kada je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara, a korovi u fazi 2-6 listova. Količina primene je: 0,04 kg/ha + **Dash®** 1 l/ha ili 0,05 kg/h a + **Dash®** 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l na 100m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasno suzbija sledeće korovske vrste: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), tarčuzak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), bročika lepuša (*Galium aparine*), divlja salata (*Lactuca serriola*), crvena mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), sitna ilja (*Geranium dissectum*), mrtva kopriva (*Lamium amplexicaule*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), čestoslavica persijska (*Veronica persica*), poljska ljubičica (*Viola arvensis*), palamida (*Cirsium arvense*), bezmirisna kamilica (*Matricaria inodora*), bulka obična (*Papaver rhoeas*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Biathlon® 4D je selektivni herbicid koji sadrži dve aktivne supstance: tritosulfuron i florasulam.

Tritosulfuron inhibira sintezu aminokiselina, a florasulam koji se apsorbuje korenom i izdanci-ma je inhibitor acetolaktat sinteze (ALS).

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Biathlon® 4D ima veliku mogućnost mešanja sa fungicidima, posebno iz grupe triazola, sa herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova u pšenici (divlji ovas), sa insekticidima iz grupe sintetskih piretroida, sa regulatorima rasta i sa tečnim đubrivima.

Plodored:

Ne ograničava plodored. Brzo se razgrađuje u zemljištu i ne šteti narednim usevima u plodoredu čak ni u slučaju redukovane obrade zemljišta.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

100g i 500g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

mezotrion 100 g/l

PRIMENA:

Chief® je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle nicanja do faze kada kukuruz ima 8 razvijenih listova, a korovi 2-6 razvijenih listova u količini 1-1,2 l/ha.

Odlikuje se dvostrukim delovanjem na korovske biljke, folijarno-preko lista i rezidualno-preko zemljišta, rešava problem prisutnih korova u vreme prskanja i sprečava nicanje novih korova 4 do 6 nedelja nakon tretmana.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom u jednokratnoj ili split aplikaciji.

SPEKTAR DELOVANJA:

Uspešno suzbija sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolika (*Chenopodium hybridum*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), tatula obična (*Datura stramonium*), renika obična (*Lepidium draba*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

NAPOMENE:

Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista, ali se može primeniti do faze 8 listova kukuruza.

Ako je potrebno da se primenjuje i u kasnijim fazama konsultujte stručno lice. Radi pojačanog delovanja na divlju kupinu, vijušac, poponac i lubeničarku **Chief®** treba kombinovati sa preparatom **Tomigan®**, a za proširenje spektra delovanja na travne korove sa preparatom **Nicogan®**.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi nikosulfurona i rimsulfurona. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. Sledeće godine nije preporučljivo gajiti šećernu repu, grašak, pasulj, spanać. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJIA:

bentazon 480 g/l + imazamoks 22,4 g/l

PRIMENA:

Preparat **Corum**® je jedan od najjačih sistemskih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH).

Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Preporuka je da se proizvod **Corum**® koristi dvokratno u količini od **0,9 + 0,9** l/ha uz dodatak 1 l/ha okvašivača **Dash**® (**0,5 + 0,5** l/ha).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom, ali podeljeno u takozvanu split aplikaciju, sa vremenskim razmakom od 14 dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Odlično suzbija najopasnije korove za soju, kao što su: abutilon (*Abutilon theophrasti*), štir (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium*

album), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula (*Datura stramonium*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), kereće grožđe (*Solanum nigrum*), čičak (*Xanthium strumarium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat **Corum**® se sastoji iz dve aktivne materije.

Bentazon pripada hemijskoj grupi benzotiadiazinona, deluje na procese fotosinteze, tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ovo je selektivni, kontaktni i folijarni herbicid. Usvaja se listom uz izrazito slabu translokaciju.

Druga aktivna materija, imazamoks, pripada hemijskoj grupi imidazolinona i inhibira aktivnost enzima ALS-a, zaustavljajući na taj način proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Ovo je selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom, kreće se ksilemom i floemom, a nakuplja se u meristemskom tkivu u kom ispoljava svoje delovanje.

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Kompatibilan je sa proizvodima na bazi pendimetalina, boskalida, alfacipermetrina, kao i sa okvašivačem **Dash**®. Ne sme se mešati sa organofosfatima i karbamatima, kao ni sa folijarnim đubrivima.

Plodored:

Usevi koji se mogu sejati u plodoredu posle primene herbicida **Corum**[®] bez ograničenja su: soja, pasulj, grašak.

Četiri meseca posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret, duvan i grašak.

Devet meseci posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač.

Dvanaest meseci posle primene, na tretiranim površinama se mogu sejati: uljana repica i šećerna repa.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

dikamba 120 g/l + mezotrion 50 g/l

PRIMENA:

Preparat **Coltrane®** je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisih korova u usevu kukuruza:

- Jednokratno u količini od 2 l/ha kada je kukuruz u fazi 2-9 lista;
- Dvokratno - prvo tretiranje obaviti u količini od 1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2-6 lista, a drugo tretiranje u količini od 0,8 l/ha u fazi od 6 do 9 lista.

Utrošak vode: 100-400 l/ha (1-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Zadovoljavajuće suzbija sledeće korovske vrste: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štir (*Amaranthus retroflexus*), divlji broć (*Gallium* sp.), troskot (*Polygonum aviculare*), njivski vijušac (*Polygonum convolvulus*), obični dvornik (*Polygonum persicaria*), divlja rotkva (*Raphanus raphanistrum*), kostriš (*Senecio vulgaris*), pomoćnica (*Solanum nigrum*), obična gorčika (*Sonchus oleraceus*), čičak (*Xanthium* sp.) i ladolež (*Calystegia sepium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Coltrane® ima dvostruk mehanizam delovanja. Sadrži dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe herbicida koje povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost pojave rezistentnosti.

Pruža folijarno delovanje preko lista i produženo zemljišno delovanje na korove.

NAPOMENE:

Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, može se sejati suncokret, dok se ne preporučuje setva šećerne repe, spanaća, graška i pasulja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



CORNISTO PRO®

FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJIA:

mezotrion 75 g/l + nikosulfuron 30 g/l

PRIMENA:

CORNISTO PRO® je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza.

CORNISTO PRO® se koristi u količini primene od 1,3 l/ha (13 ml na 100 m²), tretiranjem posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova (faza 11-18 BBCH skale), a kada se jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu, u fazi 2-6 listova, odnosno kada su travni korovi visine 15-20 cm. Preparat se primenjuje sa zemlje prskanjem pomoću leđnih i traktorskih prskalica.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat je ispoljio dobru efikasnost u odnosu na sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (*Abutilion theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthium strumarium*);

Preparat je ispoljio zadovoljavajuću efikasnost u odnosu na sledeće korovske vrste: Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), palamida njivska (*Cirsium arvensis*), divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*) i dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*).

Preparat je ispoljio slabu efikasnost u odnosu na korovsku vrstu: poponac njivski (*Convolvulus arvensis*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

- Mezotrion se apsorbuje korenom, inhibira biosintezu karotenoida. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2;
- Nikosulfuron se usvaja lišćem i korenom, inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

NAPOMENE:

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz. Organofosforni insekticidi ne smeju koristiti sedam dana pre kao ni četiri dana posle primene ovog sredstva za zaštitu bilja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju - EC

AKTIVNA MATERIJA:

S-metolahlor 960 g/l

PRIMENA:

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolinisnih korova u usevima kukuruza, soje i šećerne repe posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka.

KUKURUZ, SOJA, ŠEĆERNA REPA:

na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)
količina primene je 1,4 l/ha

na jako humoznim zemljištima (> 5% humusa)
količina primene: 1,5 l/ha

SUNCOKRET:

na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)
Količina primene: 1 l/ha

na jako humoznim zemljištima (> 5% humusa)
Količina primene: 1,2 l/ha

SIRAK

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolinisnih korova u usevu sirka za zrno i sirka metlaša i to samo u slučaju da je seme sirka predhodno tretirano preparatom Concep III 960 EC.
Količina primene: 1,5 l/ha

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi: Proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*), muhar veliki (*Setaria glauca*), svračica crvena (*Digitaria sanguinalis*), kla-

sača (*Bromus mollis*), ježevica obična (*Cynodon dactylon*);

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), tušt (*Portulaca oleracea*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), srolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), posunac (*Heliotropium europaeum*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), obična boca (*Xanthium strumarium*)

MEHANIZAM DELOVANJA:

Pripada hemijskoj grupi hloracetamida. Inhibira ćelijsku deobu i proces sinteze masnih kiselina čime se zaustavlja razvoj korova. Za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

Kategorija rezistentnosti (HRAC) K3

KARENCA:

Silažni kukuruz- 70 dana;

Merkantilni kukuruz, soja, suncokret i šećerna repa- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L I 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Suspoemulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA:

imazamoks 40 g/l

PRIMENA:

LISTEGO® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u **Clearfield®** hibridima suncokreta, odnosno hibridima suncokreta koji su tolerantni na imidazolinone.

Količina primene je 1-1,25 l/ha.

Ako se suzbija volovod (*Orobanche* spp.) preparat se primenjuje od drugog do trećeg para listova, ako se ne suzbija volovod najpovoljnije vreme primene je od nicanja do pet listova suncokreta.

ŠPEKTAR DELOVANJA:

Efikasan je u suzbijanju:

Širokolisnih korova: ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), tatula obična (*Datura stramonium*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), srcolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), boca obična (*Xanthium strumarium*), volovod (*Orobanche* spp.);

Travnih (uskolisnih) korova: muhar sivi (*Setaria glauca*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*).

NAPOMENE:

U stresnim uslovima LISTEGO® može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu, ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos suncokreta. Prilikom primene treba spečiti zanošenje preparata na susedne useve, posebno na lisnato povrće i šećernu repu.

Ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, ni pri temperaturama ispod 10°C.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima.

Plodored:

Bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i **Clearfield®** suncokret. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz, pamuk, krompir i pirinač, a dvanaest meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

fluazifop-p-butil 150 g/l

PRIMENA:

Preparat **Fusilade Forte**® se primenjuje kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usevima (suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica), povrtarskim usevima (krompir, kupus i luk) i zasadima voćaka (jabuke, kruške i dunje) u količinama primene:

- **0,8 l/ha** uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 8 ml/100 m² u 2-6 l vode za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;
- **1,3 l/ha** uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 13 ml/100m² u 2-6 l vode za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta;
- **0,6 l/ha + 0,6 l/ha** u split-aplikaciji u razmaku od 10-14 dana za suzbijanje rizomskog divljeg sirka kada je nicanje korova razvučeno.

Fusilade Forte® se na istoj površini može primeniti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primenjuje u split aplikaciji. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve (strna žita i kukuruz).

SPEKTAR DELOVANJA:

Fusilade Forte® je efikasan u suzbijanju:

- jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*), svračica (*Digitaria sanguinalis*), samonikla pšenica (*Triticum aestivum*);
- višegodišnjih travnih korova: divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*), pirevina obična (*Agropyrum repens*), zubača obična (*Cynodon dactylon*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetyl CoA karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi lipida u ćelijama korova. Mesto delovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dela, korena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno posle aplikacije i više ne konkuriše usevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično 5-7 dana nakon tretiranja i manifestuju se u promeni boje i uvenuću. Desetak dana nakon tretiranja korovi su potpuno suvi.

NAPOMENE:

Preparat treba primeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije. Kod suzbijanja **višegodišnjih** travnih korova, preparat primeniti kada je lisna masa korova

već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova).

Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomerni, najbolji rezultati se postižu kada se **Fusilade Forte**[®] primeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primene podeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana.

Preparat treba obavezno primeniti pre klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama.

Padavine čak i 1h nakon primene, ne utiču na efikasnost preparata **Fusilade Forte**[®].

Fusilade Forte[®] obično nije potrebno mešati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može mešati sa svim vrstama herbicida i insekticida za primenu u gore navedenim usevima i zasadima.

KARENCA:

Voće- 28 dana;
Krompir- 42 dana;
Luk i kupus- 49 dana;
Šećerna repa- 70 dana;
Soja, suncokret i uljana repica - obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

250 ml i 1 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FOCUS® ULTRA

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

cikloksidim 100 g/l

PRIMENA:

U usevima šećerne repe, soje, suncokreta, krompira, paradajza, voća i vinove loze se koristi za suzbijanje:

- jednogodišnjih travnih korova u količinama od 0,75 - 1 l/ha;
- divljeg sirka iz rizoma u količinama od 1,5 - 2 l/ha;
- pirevine, zubače i svračice u količinama od 3 - 4 l/ha;

Vreme primene kod šećerne repe, soje, suncokreta, krompira, paradajza je kada korovi imaju razvijena 3-5 listova; U zasadima voća i vinove loze kada su korovi visine 20-30 cm.

U usevima kukuruza koji je tolerantan na cikloksidim (CTM kukuruza) se koristi za suzbijanje:

- jednogodišnjih travnih korova u količinama od 0,75 - 1 l/ha;
- višegodišnjih travnih korova u količinama od 1,5 - 2 l/ha;

Vreme primene kod CTM kukuruza je posle nicanja, bez obzira na fazu porasta kukuruza, kada su korovi u fazi 3-5 listova.

U usevima uljane repice se koristi za suzbijanje:

- samonikle pšenice i jednogodišnjih travnih korova u količini od 1,2 l/ha ili 1,0 l/ha + 1,0 l/ha **Dash**®;
- višegodišnjih travnih korova u količini od 2 l/ha;

Vreme primene kod uljane repice: BBCH 12-32.

Utrošak vode: 100-400 l/ha (1-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Muharike (*Setaria* spp.), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), divlji sirak iz semena i iz rizoma (*Sorghum halepense*), svračica (*Digitaria sanguinalis*), pirevina (*Agropyrum repens*), zubača (*Cynodon dactylon*)

KARENCA:

Šećerna repa, suncokret i krompir- 70 dana;

Paradajz- 28 dana;

Soja i CTM kukuruz- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FRONTIER® SUPER

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJIA:

dimetenamid-P 720 g/l

PRIMENA:

Frontier® super je sistemični zemljišni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja kulture, u usevima: šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira u količini od 1,0-1,4 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat **Frontier® super** je efikasan u suzbijanju:

- jednogodišnjih travnih korova: svračica obična (*Digitaria sanguinalis*), muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), muhari (*Setaria* spp.);
- jednogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), divlja paprika (*Polygonum* sp.), kereće grožđe (*Solanum nigrum*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija, dimetenamid-P, pripada hlora-cetamidima i inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva, kao i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevažodno zemljišni herbicid koji deluje preko korenčića tek izniklih korova. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti **Frontier® super** se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

NAPOMENE:

Herbicid **Frontier® super** se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da posle primene preparata u roku od 7-10 dana padne 6-10 mm/m² kiše. Kada posle primene preparata **Frontier® super** padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može doći do kratkotrajnog zastoja u porastu useva.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

312,5 g/l S-metolahlor + 187,5 g/l Terbutilazin

PRIMENA:

GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta.

Primenjuje se posle setve, a pre nicanja useva i korova u količinama:

4-4,5 l/ha u usevu kukuruza

3,5-4 l/ha u usevu suncokreta

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), Štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), Štir obični (*Amaranthus retroflexus*), Vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), Tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), Obična pepeljuga (*Chenopodium album*), Srolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), Tatula obična (*Datura stramonium*), Lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), Dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), Veliki dvornik (*Polygonum lapatifolium*), Pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), Čistac (*Stachys annua*);

Jednogodišnji uskolisni korovi: Muhar sivi (*Setaria glauca*), Muhar zeleni (*Setaria viridis*), Divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*);

Višegodišnji korovi: Palamida njivska (*Cirsium arvense*), Poponac obični (*Convolvulus arvensis*), Renika obična (*Lepidium draba*), Divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*);

MEHANIZAM DELOVANJA:

Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz hemisjke grupe triazina, sa jakim i brzim delovanjem. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze, što za posledicu ima hlorozu i nekrozu listova. S-metolahlor je selektivni herbicid koji inhibira ćelijsku deobu i proces sinteze masnih kiselina. Biljke ga usvajaju hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom.

KARENCA:

Merkantilni kukuruz i suncokret- obezbeđena vremenom primene,

Silažni kukuruz- 60 dana.

PAKOVANJE:

1 L, 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

metamitron 700 g/l

PRIMENA:

Goltix® Gold je selektivni sistemski herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolinisnih korova u usevu šećerne repe. Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom **Powertwin®**:

Dvokratno:

Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi 2 razvijena lista, a većina korova u fazi 2 do 4 razvijena lista u količini: **Goltix® Gold** 2 l/ha + **Powertwin®** 2 l/ha;

Drugo tretiranje izvršiti 15 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista u količini: **Goltix® Gold** 2 l/ha + **Powertwin®** 2 l/ha;

Trokratno u količini: 1+1,5 +1,5 l/ha ili 1+1+2 l/ha u zavisnosti od zakorovljenosti tretirane parcele;

Prvo tretiranje početi posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista u kombinaciji sa herbicidom **Powertwin®**: **Goltix® Gold** + **Powertwin®** 1 l/ha;

Drugo i treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana, kada krene novi talas korova: **Goltix® Gold** + **Powertwin®** 1-1,5 l/ha;

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l na 100m²).

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat **Goltix® Gold** je efikasan u suzbijanju sledećih korovskih vrta: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), muhar veliki (*Echinochloa crus-galii*), dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*) i sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*).

NAPOMENE:

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spiraj.

Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (>5% humusa).

Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje.

Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla.

Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.

Može se kombinovati i sa drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi (triflusu sulfuronmetil, klopivalid...).

Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje samo posle nicanja korova. Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1L i 5L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJIA:

imazamoks 40 g/l

PRIMENA:

IMAZOFIL 40 SL je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid kontaktne i rezidualne aktivnosti, koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i neke uskolisne korove u usevu soje i suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone).

U usevu soje primenjuje se od druge do treće troliske (faze 11-12 BBCH skale), količina primene je: 1-1,2l/ha (10-12 ml u 19 l vode);

U usevu suncokreta se primenjuje jednokratno ili dvokratno;

Jednokratno: kada se razvije drugi par listova (BBCH 12-18);

Dvokratno:

- prva primena kada je suncokret u fazi do tri para razvijenih listova u količini od 0,8 l/ha;
- druga primena 7-10 dana posle prve u količini od 0,4 l/ha.

Vreme primene u odnosu na korove je od klijanja do razvoja šestog lista. Najbolja efikasnost je kada su korovi u fazi razvoja do četvrtog lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, kao i nekih uskolisnih korova.

Dobro suzbija:

- U količini 1 l/ha: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga scolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), sirak divlji iz smena (*Sorghum halepense*);
 - U količini 1.2 l/ha: širokolisni korovi kao što su: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), slačica (*Brassica nigra*), pepeljuga scolisna (*Chenopodium hybridum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), tatula obična (*Datura stramonium*), muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), svračica obična (*Digitaria sanguinalis*), (*Kicxia spuria*), buzdi-ja (*Myagrurn perfoliatum*), tušt (*Portulaca oleracea*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), mišjakin-ja obična (*Stellaria glauca*), boca obična (*Xanthium strumarium*). Širokolisni korovi kao što su: vidovčica (*Anagallis arvensis*);
 - Dvokratno u količini 0.8+0.4 l/ha: Iste korovske vrste kao i kod jednokratne primene.
- ## Zadovoljavajuće suzbija:
- U količini 1 l/ha: širokolisni korovi kao što su: pepeljuga obična (*Chenopodium album*);
 - U količini 1,2l/ha: širokolisni korov kao što je: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac obični (*Convolvulus arvensis*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*). Uskolisni korov kao što je: sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense*);

- Dvokratno u količini 0.8+0.4 l/ha: širokolisne korove kao što su palamida njivska (*Cirsium arvense*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*).

Slabo suzbija:

- U količini 1 l/ha: širokolisni korov kao što je lubenicarka njivska (*Hibiscus trionum*), uskolisni korovi, kao što je sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense*);
- U količini 1.2l/ha: uskolisni korovi kao što su pirevina obična (*Agropyrum repens*), stričak (*Cardus acanthoides*), grkušša (*Picris hieracioides*);
- Dvokratno u količini 0.8+0.4l/ha: uskolisni korovi, kao što su pirevina obična (*Agropyrum repens*), stričak (*Cardus acanthoides*), grkušša (*Picris hieracioides*), sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense*).

NAPOMENE:

U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu što se ne odražava na razvoj i prinos useva;

Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, a naročito na lisnato povrće i šećernu repu;

Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

KARENCA:

Soja- 35 dana;

Suncokret- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJIA:

tembotrion 44 g/l

Preparat sadrži ix protektant izoksadifen-etil 22 g/l

PRIMENA:

Sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Koristi se u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Spektar delovanja:

Preparat **Laudis®** je efikasan u suzbijanju:

- širokolisnih korova: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir (*Amaranthus* spp), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), tatula obična (*Datura stramonium*), prilepača (*Galium aparine*), mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), kamilica prava (*Matricaria chamomilla*), dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), običan dvornik

(*Polygonum persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), mišjakinja (*Stellaria media*), čičak (*Xanthium strumarium*)

- uskolisnih korova: veliki muhar (*Echinochloa crus-galli*), proso (*Panicum* spp), muhar sivi (*Setaria glauca*), sirak iz semena (*Sorghum halepense*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Deluje na biosintezu karotenoida, tako što inhibira enzim koji učestvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira i čitava biljka propada.

NAPOMENE:

Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C. Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen. Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak.

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak. Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Suspoemulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA:

S-metolahlor 375 g/l + terbutilazin 125 g/l + mezotrion 37,5 g/l

PRIMENA:

LUMAX® 537,5 SE je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primenjuje se:

Posle setve, a pre nicanja useva i korova u količinama: 3,5-4,0 l/ha;

Neposredno posle nicanja useva (do trećeg lista kukuruza) i korova u količinama: 3-3,5 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasan je u suzbijanju:

Širokolisnih korova: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), tatula obična (*Datura stramonium*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), boca obična (*Xanthium strumarium*), dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), palamida (*Cirsium arvense*), poponac (*Convolvulus arvensis*);

Travnih (uskolisnih) korova: muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar zeleni (*Setaria viridis*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

LUMAX® 537,5 SE je selektivni i translokacioni herbicid sačinjen od tri aktivne materije (S-metolahlor, mezotrion, terbutilazin). Predstavlja najkompletnije rešenje za suzbijanje najšireg spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. LUMAX® 537,5 SE deluje na korove preko lista i preko zemljišta, a zbog izraženog rezidualnog delovanja, sprečava naknadni ponik korova. Mezotrion obezbeđuje jako i brzo delovanje preko lista na već iznikle korove, ali i dugo rezidualno delovanje preko korena. Terbutilazin pruža dugotrajnu i snažnu zaštitu od novog nicanja korova preko zemljišta, dok S-metolahlor ima izuzetno dobro delovanje na ključne jednogodišnje travne korove preko hipokotila i izdanaka.

NAPOMENE:

LUMAX® 537,5 SE je izrazito selektivan za sve hibride kukuruza. Selektivnost ovog preparata je za kukuruz znatno veća od skoro svih postojećih herbicida, naročito u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i vlažno vreme posle prskanja).

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Efikasno suzbija i travne i širokolisne korove, te mešanje s drugim herbicidima nije potrebno.

Plodored:

U jesen iste godine može se sejati kukuruz i strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



METAFOL SUPER

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

etofumesat 150 g/l + metamitron 350 g/l

PRIMENA:

METAFOL SUPER je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevima šećerne i stočne repe.

METAFOL SUPER se može primenjivati posle setve a pre nicanja kao i posle nicanja do faze zatvaranja redova na sledeći način:

Posle setve a pre nicanja useva (00-09 BBCH) jedanput u količini primene 2 l/ha.

Posle nicanja useva do faze zatvaranja redova (10-19 BBCH), 1 – 3 puta u količini primene 2 l/ha, sa razmakom od 5 dana između tretmana.

Posle nicanja useva do faze zatvaranja redova (10-19 BBCH), u “sistemu niske doze”, 1 – 6 puta u količini primene 1 l/ha, sa razmakom od 5 dana između tretmana.

Ukupna količina primene **METAFOL SUPER**-a, u toku jedne sezone je 6 l/ha.

Primenjuje se sa zemlje, traktorskim ili leđnim prskalicama.

Utrošak vode: 150 – 400 l/ha (1,5-4 l na 100 m²).
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Maksimalan broj tretiranja: 1 – 6 na istoj površini u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Dobro suzbija: štir (*Amaranthus retroflexus*), vijušak (*Bilderdykia convolvulus*), taržučak (*Capsella bursa pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), bročika lepuša (*Gallium aparine*), crvena mrtva kopri-va (*Lamium purpureum*), mrtva kopri-va (*Lamium amplexicaule*), dvornik veliki (*Polygonum lapatifolium*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), žablja trava (*Senecio vulgaris*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), mišjakinja (*Stellaria media*), ljubičica poljska (*Viola arvensis*), livadarka jednogodišnja (*Poa annua*), proso korovsko (*Panicum crus-galli*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

METAFOL SUPER sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja.

Etofumesat usvaja se kroz izbojke i korenje. Inhibira sintezu lipida. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):15 (K3).

Metamitron usvaja se uglavnom korenom i translocira. Inhibira fotosintezu (fotosistem II). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):5 (C1).

NAPOMENE:

Da bi se izbegla oštećenja narednih useva usled mogućih ostataka u zemljištu, pre setve narednog useva treba obaviti duboku i temeljnu obradu zemljišta.

Ukoliko dođe do propadanja useva, na istoj površini se može sejati šećerna i stočna repa. Pre setve drugih useva, zemljište treba preorati na dubinu od najmanje 15 cm nakon 3 meseca od prethodne primene.

Tretirati po suvom vremenu, zdrav usev koji nije oštećen usled napada insekata ili noćnih mrazeva.

Tretiranje se ne sme izvoditi na temperaturama koje prelaze 20°C i pri jakoj sunčevoj svetlosti.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



MUSTANG™ FORTE

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

florasulam 5 g/l + aminopirialid 10 g/l + 2,4-D 2-EHE 180 g/l

PRIMENA:

MUSTANG™ FORTE je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju velikog broja široklistnih korova u usevima kukuruza i pšenice.

Kukuruz: posle nicanja useva i korova kada je kukuruz u fazi od 3 do 6 listova (faza 13-16 BBCH), a korovi u fazi od 2 do 6 listova.

Pšenica: posle nicanja useva i korova kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog kolena (faze 25-30 BBCH), a kada su korvi u fazi intenzivnog porasta.

Količina primene je od 0,8 – 1 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Spektar delovanja:

Ispoljava dobru efikasnost: zečiji gorocvet (*Adonis aestivalis*), štir (*Amaranthus retroflexus*), prstenak poljski (*Anthemis arvensis*), vijušac (*Bilderdykia convolvulus*), običan tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium album*), obični žavornjak (*Consolida regalis*), bročika lepuša (*Gallium aparine*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*), obična bulka (*Papaver rhoeas*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), poljska gorčika (*Sonchus arvensis*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), obična mišjakinja (*Stellaria*

media), persijska čestoslavica (*Veronica persica*), nana poljska (*Mentha arvensis*);

Ispoljava zadovoljavajuću efikasnost: njivska palamida (*Cirsium arvense*), obična dimnjača (*Fumaria officinalis*), crvena mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), obična drenika (*Lepidium draba*), pomoćnica (*Solanum nigrum*), obična boca (*Xanthium strumarium*).

Mehanizam delovanja:

MUSTANG™ FORTE u sebi sadrži tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja što pruža visok nivo efikasnosti u suzbijanju korovskih vrsta. 2,4-D 2-EHE: Selektivni sistemični herbicid iz grupe sintetičkih auksina. Inhibira rast biljaka.

Aminopirialid: Sistemični herbicid, apsorbuje se preko lista i korena, ima i rezidualno delovanje.

Florasulam: Sistemični herbicid, apsorbuje se preko lista i korena, kreće se ksilemom i floemom kroz biljku, spada u ALS inhibitore.

Karenca:

60 dana.

Pačovanje:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJIA:

metamitron 700 g/l

PRIMENA:

Metafol 700 SC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

Vreme primene:

- nakon setve, a pre nicanja šećerne repe (pre-em) u količini od 1,7 L/ha (pre-em primena samo ako zemljište ima dovoljno vlage);
- nakon nicanja šećerne repe (post-em) u stadijumu razvoja do 8 listova (BBCH 18) u split aplikaciji:

1.) 2 x 1,7 l/ha;

2.) 3 x 1,3 l/ha;

3.) 4 x 1,0 l/ha

Razmak između tretiranja je od 6 do 14 dana.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom (jednokratno) ili višekratno (split aplikacija) uz maksimalnu količinu do 4 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasno uništava korove kao što su: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), repica crna (*Brassica nigra*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga hibridna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura*

stramonium), prilepača (*Galium aparine*), dimnjača obična (*Fumaria officinalis*), veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*), dvornik obični (*P. persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), jednogodišnji čistac (*Stachys annua*), obična mišjakinja (*Stellaria media*), palamida njivska (*Cirsium arvense*) iz semena, poponac njivski (*Convolvulus arvensis*) iz semena.

NAPOMENE:

Metafol 700 SC ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima sa više od 5% humusa.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa aktivnim materijama na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusufluron-metila i klopiralida radi šireg spektra delovanja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



METRIKS 600 SC

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

metribuzin 600 g/l

PRIMENA:

METRIKS 600 SC je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira.

Količina i vreme primene:

Soja: tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja u količini od 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.

Krompir: tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira, u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.

Tretiranjem zemljišta posle nicanja krompira u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

METRIKS 600 SC suzbija sledeće korovske vrste:

Dobro suzbija: teofrastovu lipicu (*Abutilon theophrasti*), štireve (*Abutilon theophrasti*), repicu crnu (*Brassica nigra*), pepeljugu (*Chenopodium* spp.), tatulu običnu (*Datura stramonium*), rotkvu divlju (*Raphanus raphanistrum*), gorušicu poljsku (*Sinapis arvensis*), sivi muhar (*Setaria glauca*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*);

Zadovoljavajuće suzbija: ambroziju pelenastu (*Ambrosia artemisifolia*), lubeničarku njivsku (*Hibiscus trionum*), proso korovsko (*Echinochloa crus galli*), tarčuzak obični (*Capsella bursa-pastoris*).

Slabo suzbija: divlji sirak (*Sorghum halepense*), obični poponac (*Convolvulus arvensis*), običnu pomoćnicu (*Solanum nigrum*).

NAPOMENE:

- Ne sme se primenjivati:
 - u usevu soje posle nicanja useva;
 - na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog fitotoksičnosti;
 - na jako humusnim zemljištima (> 6% humusa) zbog vezivanja za čestice zemljišta;
 - u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40, SV 76/48, a za nove sorte krompita treba ispitati selektivnost;
 - u usevu paradajza iz semena;
- U usevu soje može se primenjivati samo pod uslovom da na tim površinama ostaci atrazina i simazine nisu > 0,1ppm.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

U usevu soje može se mešati sa preparatima na bazi metalohlora i dimetenamida.

U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva, može se mešati sa preparatima na bazi metalohlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.

Ne meša se sa drugim herbicidima kada se primenjuje u krompiru posle nicanja. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

Plodored:

- Četiri meseca posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: soja, krompir, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam i kukuruz;
- Osam meseci posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati: grašak, sočivo, pšenica i ječam.
- Dvanaest meseci posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šćerna repa i luk.

Usevi koji se mogu sejati ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja (posle primene pesticida) su krompir, soja, paradajz i lucerka.

KARENCA:

Soja- obezbeđena vremenom primene;

Krompir- 42 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJIA:

dikamba 220 g/l + nikosulfuron 50 g/l

PRIMENA:

Milagro® Plus je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primenjuje se:

Jednokratno - nakon nicanja kada je kukuruz u fazi od 2-8 listova u količini: 0,8-1,2 l/ha;

Dvokratno - prvo tretiranje se obavlja kada je kukuruz u fazi 2-8 listova, a drugo 5-10 dana nakon prvog u količini: 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 l/ha + 0,4 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasan je u suzbijanju:

Širokolisnih korova: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), srcolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), divlji suncokret (*Helianthus annuus*), tatula obična (*Datura stramonium*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), boca obična (*Xanthium strumarium*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*);

Travnih (uskolisnih) korova: divlji sirak iz semena i rizoma (*Sorghum halepense*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Milagro® Plus predstavlja rešenje koje omogućava da jednim prohodom suzbijemo uskolisne i širokolisne korove u usevu kukuruza. Sastoji se iz dve aktivne materije (dikamba i nikosulfuron) različitog mehanizma i spektra delovanja.

Dikamba je dugo godina unazad korišćen i dokazan herbicid izrazito translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova. Apsorbuje se preko listova i translocira kroz celu biljku.

Nikosulfuron deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta korovskih biljaka. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid koji se usvaja preko lista i korena. U biljci se kreće ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivama u kojima ispoljava svoje delovanje.

NAPOMENE:

S obzirom da je reč o OD formulaciji, **Milagro® Plus** karakteriše manje zanošenje prilikom tretiranja, bolje pokrivanje lisne površine, bolje prijajanje i teže spiranje ukoliko dođe do kiše nakon tretmana.

Organofosfatni insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene sredstva, da ne bi došlo do smanjenja njegove selektivnosti prema kukuruzu.

Plodored:

U jesen iste godine posle dubokog oranja mogu se sejati ozima strna žita i uljana repica. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, jara strna žita i jara uljana repica.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJIA:

mezotrion 480 g/l

PRIMENA:

METTO je selektivni, translokacioni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza radi suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i nekih travnih korova. Primenjuje se posle nicanja useva kukuruza, kada je kukuruz u fazi od 2-8 listova (faze 11-18 BBCH-skale) a korovi u fazi 2-8 listova.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjen u količini od 0,15 l/ha uz dodatak 0,5% okvašivača Magis dobro suzbija sledeće korovske vrste: obični taržućak (*Capsella bursa-pastoris*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), hibridna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), njivska palamida (*Cirsium arvense*), obična tatula (*Datura Stramonium*), obična pomoćnica (*Solanum nigrum*), poljska gorušica (*Sinapsis arvensis*), obična boca (*Xanthium strumarium*).

Primenjen u količini od 0,25 l/ha uz dodatak 0,5% okvašivača Magis dobro suzbija sledeće korovske vrste: obični štir (*Amaranthus retroflexus*), bljutavi štir (*Amaranthus blitoides*), obični taržućak (*Capsella bursapastoris*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), hibridna pepeljuga

(*Chenopodium hybridum*), njivska palamida (*Cirsium arvense*), obična tatula (*Datura Stramonium*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), veliki dvornik (*Polygonum lapathifolium*), obična pomoćnica (*Solanum nigrum*), poljska gorušica (*Sinapsis arvensis*), jednogodišnji čistac (*Stachys annua*), obična mišjakinja (*Stellaria media*), obična boca (*Xanthium strumarium*).

Zadovoljavajuće suzbija: jednogodišnje širokolisne korove kao što je: vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*).

Slabo suzbija: jednogodišnje širokolisne korove kao što je: lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*) i jednogodišnje uskolisne korove kao što su: proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*) i muhar sivi (*Setaria glauca*).

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Preparat **METTO** može da se meša sa preparatima na bazi nikosulfurona, rimsulfurona, S-metolahlora, terbutilazona.

Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

Plodored:

Usevi koji se mogu sejati u normalnom plodoredu (posle primene pesticida):

U jesen iste godine strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje.

U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.

Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

metribuzin 700 g/kg

PRIMENA:

Preparat **Mistral®** je selektivni sistemični herbicid, primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

- Na površinama za proizvodnju **krompira**, tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva, u količini:

- **0,75 kg/ha** na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa;

- **1,5 kg/ha** na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;

- U usevu **krompira**, tretiranjem posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količini:

- **0,5 kg/ha** na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa;

- **0,75 kg/ha** na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;

- U usevu soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva u količini:

- **0,5 kg/ha** na zemljištima sa 3-5% humusa;

- **1 kg/ha** na zemljištima sa >5% humusa;

- U usevu **lucerke**, tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini:

- **0,5 kg/ha** na zemljištima sa 1-3% humusa;

- **1 kg/ha** na zemljištima sa >3% humusa;

- U usevu **paradajza** (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja u količini:

- **0,5 kg/ha** na zemljištima sa 3-5% humusa;

- **0,75 kg/ha** na zemljištima sa >5% humusa.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/m²).

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat **Mistral®** je efikasan u suzbijanju:

- jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsti: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štirevi (*Amaranthus* spp), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), loboda obična (*Atriplex patula*), tarčuzak obični (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuge (*Chenopodium* spp), tatula obična (*Datura stramonium*), lubeničarska njivska (*Hibiscus trionum*), divlja salata (*Lactuca serriola*), crvena mrtva kopriiva (*Lamium purpureum*), dvornici (*Polygonum* spp), rotkva divlja (*Raphanus raphanistrum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), persijska čestoslavica (*Veronica persica*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Metribuzin pripada hemijskoj grupi triazinona. Deluje na proces fotosinteze tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II.

NAPOMENE:

Mistral® ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Ne ograničava plodored, ali ako će se nakon krompira saditi kupusnjače ne treba primeniti **Mistral®** u krompiru. U **krompiru** je najbolja praksa da se primenjuje dvokratno. Prvi tretman uraditi kada je niklo oko 70% biljaka sa dozama **0,35-0,5 kg/ha** i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje sa dozama **0,5-0,75 kg/ha**. Ukupna doza **ne treba** da pređe **1 kg/ha** na lakim zemljištima, odnosno **1,2 kg/ha** na teškim zemljištima.

U **soji** na jako zakorovljenim parcelama **Mistral®** primenjen pre nicanja u dozi od **0,5 kg/ha** omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

U **lucerki** tretman pred kraj zimskog mirovanja (u vreme buđenja lucerke) se može smatrati osnovnim tretmanom u zasnovanoj lucerki (od druge godine). Ovaj tretman ne treba raditi u prvoj godini vegetacije. Doza primene je **0,5-0,75 kg/ha**. Naročito je pogodan ako su dominantni korovi mišjakinja (*Stellaria media*) i tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*).

U **paradajzu** iz direktne setve može se takođe primeniti, najranije u fazi 2-3 prava lista. **Doze ne smeju biti veće od 0,25 kg/ha.**

KARENCA:

Krompir i paradajz- 42 dana;

Soja i lucerka- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



MONSOON® ACTIVE

FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA:

foramsulfuron 30 g/l + tienkarbazon-metil 10 g/l

Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 15 g/l

PRIMENA:

Koristi se u usevu kukuruza u količini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova. Tako, pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom preporučuje se maksimalna količina primene (1,8 l/ha). Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada rizomski sirak dostigne 20-25 cm visine.

Utrošak vode: 150 - 400 l/ha (1,5-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom ili dva puta kod primene podeljene doze u razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

- Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), boca obična (*Xanthium strumarium*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), mišjakinja (*Stellaria media*), palamida njivska

(*Cirsium arvense*), pepeljuga baštenska (*Chenopodium polyspermum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), poponac (*Convolvulus arvensis*), sunčokret samonikli (*Helianthus annuus*), tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), tatula obična (*Datura stramonium*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*);

- Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi: divlji sirak iz semena i rizoma (*Sorghum halepense*), muhar sivi (*Setaria glauca*), pirevina (*Agropyron repens*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil, pripadaju grupi ALS inhibitora i poseduju isti mehanizam delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazon-metil ima dvostruki način usvajanja – pored lista i korenom korova. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima acetolat sintetaze (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.

Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

NAPOMENE:

Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu (bez vetra) i na temperaturama nižim od 25°C, u slučaju očekivanih velikih temperaturnih kolebanja odložiti tretman do stabilizacije vremenskih uslova;

Sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata **MONSOON® ACTIVE**.

Plodored:

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz, pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm; Nakon isteka 3 meseca uz prethodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;

U jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira;

Setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana uljna suspenzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA:

nikosulfuron 40 g/l

PRIMENA:

Nicogan® je selektivni sistemični herbicid, primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Jednokratna primena: tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova, a korovi u fazi razvijenih 2-6 listova, u količini 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova ili u količini 1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka (*Sorghum halepense*) iz rizoma, tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm;

Dvokratna primena: prvo tretiranje obaviti u količini 0,5 l/ha, kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a divlji sirak tek iznikao. Drugo tretiranje obaviti kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm u količini 0,75 l/ha.

Može da se primenjuje u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Bezbedno se može primenjivati do faze 8 listova kukuruza.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4l l/m²)

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine u jednokratnoj ili dvokratnoj primeni.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasno suzbija korovske vrste: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), ladolež divlji (*Calystegia sepium*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), tatula obična (*Datura stramonium*), proso

korovsko (*Echinochloa crus-galli*), suncokret samonikli (*Helianthus annuus*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik veliki (*Polygonium lapathifolium*), dvornik obični (*Polygonium persicaria*), muhar sivi (*Setaria glauca*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), poljska gorčika (*Sonchus arvensis*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), jednogodišnji čistac (*Stachys annua*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

NAPOMENE:

Korovi poput zubače i pirevine se vrlo teško suzbijaju hemijskim putem, pa će i pune doze preparata dati samo delimičan efekat. Rizomski divlji sirak ako je prerastao fazu 5 listova i što je bliži metličanju to je manje osetljiv na herbicide iz ove grupe. Takođe što je duži rizomski splet to je veća verovatnoća regeneracije. Jednogodišnji travnati korovi, što su mlađi to su osetljiviji, kada formiraju više od 3 prava lista takođe im se povećava otpornost.

Ako su korovi pod stresom od suše, visokih temperature slabije će da usvajaju herbicide, a ovi će biti manje efikasni.

Preparat sadrži okvašivač i ne treba mu posebno dodavati drugi.

Dobro se meša sa drugim uobičajenim herbicidima koji se primenjuju u kukuruzu.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1L i 5L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



PULSAR® 40

FORMULACIJA:

Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

imazamoks 40 g/l

PRIMENA:

Pulsar® 40 je sistemični herbicid koji se primenjuje nakon nicanja gajene kulture u usevima soje, graška, pasulja i u hibridima suncokreta **Clearfield®** sistema proizvodnje, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih uskolisnih korova u količini od 1-1,2 l/ha. Suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja.

U usevu soje se primenjuje u fazi 1-3 troliske, a u usevu **Clearfield®** suncokreta u fazi 1-3 paralistova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat **Pulsar® 40** je efikasan u suzbijanju sledećih korova: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisifolia*), tarčužak (*Capsella bursa pastoris*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), tatula (*Datura stramonium*), divlja paprika (*Polygonum spp.*), gorušica (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigurum*), čičak (*Xanthium strumarium*), veliki muhar (*Echinochloa crus-galli*), muhar (*Setaria spp.*), sirak iz semena (*Sorghum halepense*), volod (*Orobancha spp.*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Pripada grupi imidazolinona. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) koji je neophodan za sintezu esencijalnih aminokiselina valin, leucin i izoleucin, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i samim tim rasta biljaka.

Pulsar® 40 se lako usvaja putem korena i listova, a potom se translocira kroz korovsku biljku dovodeći do sušenja njenog vršnog dela.

NAPOMENE:

Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova 1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 l po katastarskom jutru. Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata, tj. 0,6+0,6 l/ha.

Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamide (*Cirsium arvense*) i poponca (*Convolvulus spp.*) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti.

U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Plodored:

Nakon gajenja kultura tretiranih sa **Pulsar® 40** mogu se gajiti:

- posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan;
- posle 9 meseci: kukuruz i krompir;
- posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa.

KARENCA:

35 dana

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJAS:

rimsulfuron 23 g/kg + nikosulfuron 92 g/kg + dikamba 550 g/kg

PRIMENA:

Principal® PLUS se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.

Primenjuje se posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), u količini 440 g/ha + 0,1% okvašivača **Trend® 90**.

Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:

- višegodišnji uskolisni korovi od 3 do 5 listova;
- jednogodišnji uskolisni korovi od 1 lista do faze bokorenja;
- širokolisni korovi od 2 do 6 listova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha(2-4l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Principal® PLUS je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. On je kombinacija tri aktivne materije, dikamba herbicida kao regulatora rasta i sulfonilurea herbicida – rimsulfurona i nikosulfurona sa izuzetno širokim spektrom delovanja.

Primenjuje se za suzbijanje:

Jednogodišnjih uskolisnih korova, kao što su:
proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), muhar sivi (*Setaria glauca*), muhar lepljivi (*Setaria verticiliata*), muhar zeleni (*Setaria viridis*), sirak divlji iz semena (*Sorghum halepense*);

Višegodišnjih uskolisnih korova, kao što su:
sirak divlji iz rizoma (*Sorghum halepense*), pirevina obična (*Agropyrum repens*);

Jednogodišnjih širokolisnih korova, kao što su:
štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), ambrozija peleanasta (*Ambrosia artemisiifolia*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga (*Chenopodium album*), srolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), boca obična (*Xanthium strumarium*);

Višegodišnjih širokolisnih korova, kao što su:
palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*).

NAPOMENE:

Posle primene **Principal® PLUS**, mogu se sejati sledeći usevi:

- iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana;
- naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz, kukuruz, šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret;

U slučaju da usev tretiran **Principal® PLUS** - om propadne iz bilo kog razloga, odmah se mogu sejati samo kukuruz i soja.

U slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

440g

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**

Principal®

PLUS

HERBICID

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

flurohloridon 250 g/l

PRIMENA:

Racer® je selektivni sistemični herbicid. Primenuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

U usevu suncokreta se tretira posle setve, a pre nicanja useva u količini 2-4 l/ha u zavisnosti od tipa zemljišta;

U zasadu krompira se tretira posle sadnje, a pre nicanja useva u količini 2-4 l/ha;

U zasadu voća i vinove loze se tretira u proleće, pre ili odmah posle nicanja korova u količini 1-3 l/ha u mladim zasadima (starosti 1-3 godine) i 4 l/ha u zasadima starosti preko 4 godine.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Racer® je efikasno suzbija sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), konica obična (*Galinsoga parviflora*), mrtva koprija crvena (*Lamium purpureum*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), mišjakinja obična (*Stellaria media*).

Odlično suzbija: gorušicu (čak i u fazi rozete), štir, pepeljugu, abutilon i pomoćnicu;

Zadovoljavajuće suzbija: muhare i ambroziju (kada je veliki pritisak deo se provuče);

Slabije suzbija: dvornike i vijušce, divlju konoplju, palamidu, čičak.

NAPOMENE:

Da bi ispoljio svoje maksimalno delovanje mora da u roku od 14 dana posle primene bude najmanje 10mm padavina.

Ako se primenjuje posle setve, a pre nicanja najbolje rezultate daje u dozi od 2,5 l/ha ili u inkorporaciji, ali tada primeniti doze od 3 l/ha.

Ekonomnično rešenje (najbolji odnos uloženo-dobijeno) je doza od 2 l/ha.

Moguća je primena i u ranom post tretmanu, kada je suncokret u fazi do 2 lista, ali isključivo sam i u dozi od 2 l/ha. Ovaj tretman ne bi trebalo da radite pre nego se konsultujete sa stručnjakom.

KARENCA:

Krompir- 63 dana;

Suncokret, voće i vinova loza- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

kletodim 120 g/l

PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA:

SELECT® SUPER je visoko selektivan translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jedno-godišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u sledećim usevima: soja, suncokret, šećerna repa, lucerka, krompir, paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, grk, pasulj, kupus, mrkva, crni i beli luk.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Količina i vreme primene:

- 0,8 l/ha (8 ml/100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova kao sto su korovsko proso (*Echinochloa crus-galli*), muharike (*Setaria* spp.), svračice (*Digitaria sanguinalis*), divljeg prosa (*Panicum* spp.) i dr., u stadijumu 3-5 listova;
- 1,2 l/ha (16-20 ml/100 m²), za suzbijanje višegodišnjih travnih korova kao sto su divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*), u stadijumu do 30 cm visine korova i 2 l/ha (20 ml/100 m²), za suzbijanje pirevine (*Agropyrum repens*), u stadijumu 15-20 cm visine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Kletodim pripada cikloheksanonima i po mehanizmu delovanja je inhibitor enzima acetil CoA karboksilaze, koji je neophodan za sintezu masti.

KARENCA:

Soja, suncokret, šećerna repa, krompir i lucerka-obebeđena vremenom primene;

Grašak, pasulj, dinju, lubenicu, krastavac, kupus, mrkvu, crni luk i beli luk- 30 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor - SL

AKTIVNA MATERIJA:

Imazamoks 80 g/l

PRIMENA:

U usevu soje se primenjuje posle nicanja kada je soja u fenofazi od dvopera do drugog trolista, a korovi u fazi 2-4 razvijena lista. Količina primene: 0,5-0,6 l/ha.

U usevu suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone) se primenjuje:

Jednokratno, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova. Količina primene: 0,6 l/ha.

Dvokratno, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog; Količina primene: prvi tretman: 0,4 l/ha, drugi tretman: 0,2 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/h

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki uskolisni korovi: štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), vijušac njivski (*Bilberdykia convolvulus*), tatula (*Datura stramonium*), muhar sivi (*Setaria glauca*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Saltus® je selektivni sistemski herbicid, kontaktne i rezidualne aktivnosti. Inhibira sintezu biljnih aminokiselina (inhibitor acetolaktat sintetaze – ALS inhibitor)

Kategorija rezistentnosti (HRAC) B

NAPOMENE:

U suncokretu primenu Saltus®-a prilagoditi uzrastu korova, a ne uzrastu suncokreta. Drugim rečima, najbolji efekat se postiže ako su korovi u fazi ponika – prvog lista, bez obrzira na fazu razvoja suncokreta.

Saltus® je pogodan i za suzbijanje divlje konoplje (*Canabis spp.*) ali punu efikasnost može da ostvari samo ako konoplja nije veća od 2 razvijena lista. Zato je najbolje raditi višekratne tretmane u dozama 0,25-0,3 l/ha u razmacima od 7-10 dana, odnosno kada se uoči novo nicajne konoplje ili krenu da se javljaju zaperci na već postojećem korovu. Ukupna doza ne treba da pređe 1 l/ha.

Sličan pristup je preporučljiv i u suzbijanju drugih robusnih širokolisnih korova (ambrozije, boce obične, vijušca njivskog). Poslednji bezbedan momenat za primenu je kada je suncokret u fazi 6 razvijenih listova.

Kao i ostale preparate na bazi imazamoksa, u soji ga nikada ne primenjivati samostalno jer punu efikasnost ispoljava samo sa partner herbicidom (tifensulfuron-metil i bentazon).

U suzbijanju pepeljuge ima relativno dobru efikasnost samo do faze 2 lista i u dozi od 0,6 l/ha. Najmanje 7 dana pre ili posle preparata na bazi imazamoksa ne primenjivati druge preparate za suzbijanje uskolisnih korova, jer postoji rizik od jake fitotoksije, pa i uništavanja soje.

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona.

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Usevi koji se mogu sejati u plodoredu posle primene herbicida:

- bez ograničenja: soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona;
- 4 meseca posle primene na tretiranim površinama može se sejati: ječam, pšenica, raž, ovas, suncokret i duvan;
- 9 meseci posle primene na tretiranim površinama može se sejati: kukuruz i krompir;
- 12 meseci posle primene na tretiranim površinama može se sejati: uljana repica i šećerna repa.

KARENCA:

Soja- 35 dana;

Obezbeđena vremenom primene za suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona.

PAKOVANJE:

5L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



SEKATOR OD

FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJIA:

jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l

Preparat sadrži i protektant mefenpir-dietil 250 g/l

PRIMENA:

Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²)

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Sekator OD je efikasan u suzbijanju:

- jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), vidovčica crvena (*Anagalis arvensis*), prstenak poljski (*Anthemis arvensis*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), žavornjak obični (*Delphinium consolida*), bročika lepuša (*Galium aparine*), mrtva kopriva njivska (*Lamium amplexicaule*), mrtva kopriva crvena (*Lamium purpureum*), kamilica prava (*Matricaria chamomilla*), kamilica bezmirisna (*Matricaria inodora*), bulka obična (*Papaver rhoeas*), ljutić njivski (*Ranunculus arvensis*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), čistac jednogodišnji

(*Stachys annua*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), čestoslavica persijska (*Veronica persica*), čestoslavica bršljenasta (*Veronica hederifolia*);

- višegodišnjih širokolisnih korova: palamida njivska (*Cirsium arvense*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju sulfonilureama. One dovode do inhibicije enzima acetolaktat-sintetaze, pri čemu izostaje sinteza esencijalnih aminokiselina leucina, valina i izoleucina, što dovodi do zaustavljanja ćelijske deobe i rasta biljaka. Biljka ih usvaja folijarno, a unutar biljke šire se floemom i ksilemom. Njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te obezbeđuje punu selektivnost prema gajenim usevima.

NAPOMENE

Tretirati predveče ili rano tokom dana, po mirnom vremenu, na temperaturama nižim od 25°C i kada se usev nalazi u dobroj kondiciji.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa insekticidima i fungicidima za primenu u usevu pšenice i ječma. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja. Takođe **Sekator OD** se može mešati sa azotnim đubrivima, mineralnim uljima i regulatorima rasta.

Plodored:

Ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama može se sejati:

- posle 15 dana: jara pšenica i jara ječam;
- posle 30 dana: kukuruz uz oranje.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

150 ml i 1 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

S - metolahlor 960 g/l

PRIMENA:

STRIM je selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i šećerne repe. Primenjuje se posle setve a pre nicanja useva i korova, u količini 1,5 l/ha (15 ml na 100m²).

STRIM se primenjuje sa zemlje, folijarno, prskanjem svim tipovima prskalica. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja: Jedno tretiranje na istoj površini u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Dobro suzbija sledeće jednogodišnje uskolisne korove: klasača maljava (*Bromus mollis*), muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), sivi muhar (*Setaria glauca*).

Dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove: obični štir (*Amaranthus retroflexus*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), konica obična (*Galinsoga parviflora*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*).

Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sina-*

pis arvensis).

Slabo suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

Slabo suzbija sledeće višegodišnje širokolisne korove: palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*).

Slabo suzbija sledeće višegodišnje uskolisne korove: divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

STRIM je herbicid iz grupe hloracetamida. Inhibira ćelijsku deobu. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Biljke ga usvajaju predominantno hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).

NAPOMENE:

Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (< 1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH < 5,5. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati: kukuruz, ali bez dodatnog tretiranja herbicidima, soja, krompir, pasulj, grašak, šećerna repa i paprika iz rasada.

Plodored: u normalnom plodoredu nema ograničenja, a posle 6 meseci, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene preparata

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!

STRIM[®]

HERBICID

PRIMENA: STRIM JE SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH I NEKIH VIŠEGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVA U USEVIMA KUKURUZA, SOJE I ŠEĆERNE REPE, POSLE SETVE A PRE NICANJA USEVA I KOROVA.

Herbicid, EC - koncentrat za emulziju
Sastav preparata (aktivna materija) i sadržaj: S - metolahlor 960 g/l

Klasifikacija rezistentnosti HRAC:
GRUPA 0 (Z) HERBICID

Dozvola za stavljanje u promet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj: 321-01-727/2019-11 od 05.04.2019. godine sa svim važećim izmenama i dopunama.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE PRATEĆEG UPUTSTVA I ETIKETE KAKO BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU!

Obaveštenja o opasnosti
H317 – Može da izazove alergijske reakcije na koži
H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Obaveštenja o merama predostrožnosti
P102 – Čuvati van domašaja dece
P280 – Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice
P302 + P352 – AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode
P391 – Sakupiti prosići sadržaj
P501 – Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima
Dodatno obaveštenje o opasnosti:
EUH 401: Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Distributer i uvoznik: DELTA AGRAR d.o.o., Vladimira Popovića 8a, Beograd, Srbija
tel: 011 201 2300

Zastupnik: TVS Moneta d.o.o., Balkanska 29, Beograd, Srbija
tel.: 011 406 16 82

Proizvođač: UPL Europe Ltd., Velika Britanija
Rok trajanja: 2 godine
Datum proizvodnje i broj šarže: utisnuti na ambalaži

DELTA AGRAR

1 L
NETO KOLIČINA

UPL

85290466-02-2023



8 605043 097462 >

SUHOY

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

tifensulfuron-metil 750 g/kg

PRIMENA:

SUHOY je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje.

Primenjuje se u količini primene 8 g/ha (0.08 g na 100 m²) + 0.1 % okvašivača na bazi izodecil alkoholetoksilat 900 g/l kada su korovi u fazi 2-6 listova, a soja u fazi prve troliske, fazi 1-3 lista (faze 11-13 BBCH-skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja je jednom na istoj površini u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Dobro suzbija: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolicna (*Ch. Hybridum*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*);

Zadovoljavajuće suzbija: dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), tatula obična (*Datura stramonium*), obična boca (*Xanthium strumarium*);

Slabije suzbija: ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), palamida (*Cirsium arvense*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Selektivni herbicid, apsorbuje se preko lišća. Inhibitor acetolaktat sintaze (ALS inhibitor).

NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati:

- Ukoliko soja nije formirala prvu trolisku;
- Ukoliko je usev pod stresom;
- Ukoliko su temperature vazduha više od 25°C.
- Ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu niza od 10°C;
- Pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha;
- Ukoliko su prethodno primenjeni sistemični zemljišni organofosforni insekticidi.
- Na kosim, erozivnim površinama i kraškim poljima zbog isparljivosti;
- Folijarni i organofosforni insekticidi ne smeju se primenjivati 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog sredstva za zaštitu blja.;
- Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima, preparatima na bazi bentazona i imazamoksa.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

8 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

STOMP® AQUA

FORMULACIJA:

Suspencija kapsula (CS)

AKTIVNA MATERIJIA:

pendimetalin 455 g/l

PRIMENA:

Selektivni herbicid koji se primenjuje u suzbijanju jednogodišnjih travnih i širolisnih korova.

Količine i vreme primene:

- Crni i beli luk: 2,5 - 3 l/ha, tretiranje zemljišta se vrši posle setve, a pre nicanja useva i korova;
- Šargarepa: 2,5 - 3 l/ha, tretiranje se vrši pre nicanja, preko zemljišta – po celoj površini;
- Kupus: 2,5 - 3 l/ha, primenjuje se kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova;
- Malina: 2,9 l/ha, tretman izvršiti pre kretanja vegetacije;
- Grašak i krompir: 3,5 l/ha, tretiranje se vrši nakon setve, a pre nicanja useva;
- Paradajz i paprika: 3,5 l/ha tretiranje se vrši pre rasađivanja, bez inkorporacije;
- Jabuka: 3,5 l/ha tretiranje se vrši godinu dana nakon sadnje, u rano proleće, pre nicanja korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Dobro suzbija: proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), sivi muhar (*Setaria glauca*), obični štir (*Amaranthus retrofl exus*), štir srcolisni (*A. hybridus*), tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), obični ljutić (*Ranunculus arvensis*), jednogodišnji čistac (*Stachys annua*), poljska čestoslavica (*Veronica hederifolia*);

Zadovoljavajuće suzbija: lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), kamilica (*Matricaria chamomilla*), obični dvornik (*Polygonum persicaria*), obična gorčika (*Sonchus oleraceus*), mišjakinja (*Stellaria media*)

NAPOMENE:

Stomp® Aqua se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci: flufenacet, oksifluorfen, izoproturon, bentazon, metolahlor, linuron, metazahlor, nikosulfuron, klodinafop-proparžil i dimetenamid-P.

Osim što se preparat **Stomp® Aqua** može mešati, tj. kompatibilan je sa preparatima na bazi gore navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama pre komercijalne upotrebe.

KARENCA:

Crni i beli luk- 75 dana;

Šargarepa- 60 do 90 dana;

Kupus- 90 do 100 dana;

Malina- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



TRIFARI WG-50

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJIA:

triflusulfuron-metil 500 g/kg

PRIMENA:

Preparat **TRIFARI WG-50** se koristi u usevu **šećerne repe** dvokratno u cilju suzbijanja širokolisnih korova. Primenjuje se ili sam preparat u količini **40 g/ha + 40 g/ha** ili u kombinaciji sa drugim preparatima u količini **30 g/ha + 30 g/ha**, uvek uz dodatak okvašivača i to:

- **prvo tretiranje** kada je šećerna repa iznikla 70-90%;
- **drugo tretiranje** 8-14 dana kasnije, odnosno kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista, a korovi su u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

TRIFARI WG-50 je selektivni herbicid za suzbijanje

- jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*).

U kombinaciji sa preparatima na bazi **desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona** i njihovih mešavina suzbija:

- **širokolisne korovske vrste**: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), mrkva divlja (*Daucus carota*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Triflusulfuron-metil pripada sulfonilureama. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS) koji je ključni enzim u biosintezi aminokiselina, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka.

NAPOMENE:

- Optimalna temperatura za tretiranje je 18°C, a tretiranje treba vršiti na temperaturama 7-25°C;
- U slučaju propadanja useva, može se sejati samo šećerna repa;
- Ne mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

60 g

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



TBM 75 WG

FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

tribenuron-metil 750 g/l

PRIMENA:

TBM 75 WG je selektivni tanslokacioni folijarni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron-metil).

U usevu pšenice se primenjuje od faze 3 lista pa do pojave drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale), a korovi do faze 6 listova u količini primene od:

- 15 g/ha (0,15 g na 100 m²) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena;
- 20 g/ha (0,25 g na 100 m²) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida);
- 25 g/ha (0,25 g na 100 m²) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) za suzbijanje palamide, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 razvijjenih listova.

U usevu suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil) se primenjuje u količini od 30 g/ha (0,30 g na 100 m²) + okvašivača izodecil alkohol etoksi-

lat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %), posle nicanja useva kada suncokret ima 2-8 listova (faze 12-18 BBCH –skale), a korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom, u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

U usevu pšenice:

Dobro suzbija: prstenak poljski (*Anthemis arvensis*), smrdušica obična (*Bifora radians*), tarčužak obični (*Capsella bursa-pastoris*), žavornjak obični (*Consolida regalis*), mrkva divlja (*Daucus carota*), njivska mrtva kopriva (*Lamium amplexicaule*), kamilica divlja (*Matricaria inodora*), bulka obična (*Papaver rhoeas*), ljutić njivski (*Ranunculus arvensis*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*) i poljska ljubica (*Viola arvensis*);

Zadovoljavajuće suzbija: dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*);

Slabo suzbija: poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), broćika lepuša (*Galium aparine*) i čestoslavica pršljenasta (*Veronica hederifolia*).

U odnosu na palamidu njivsku (*Cirsium arvense*): dobro suzbija u količinu primene 25 g/ha; zadovoljavajuće suzbija u količinu primene 20 g/ha; slabo suzbija u količinu primene 15 g/ha.

U usevu suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil):

Dobro suzbija: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pelenasta ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), tatula obična (*Datura stramonium*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*) i boca obična (*Xanthium strumarium*);

Slabo suzbija: poponac njivski (*Convolvulus arvensis*) i dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

TBM 75 WG je herbicid iz grupe sulfoniluree. Apsorbuje se folijarno i korenom i translocira po svim delovima biljke. Inhibitor biosinteze esencijalnih kiselina, ALS-inhibitor (inhibicija acetolaktat sinteze).

Herbicidi iz ove grupe na bazi tribenuron-metil prema HRAC listi svrstani su u B grupu rezistentnosti.

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:

TBM 75 WG u usevu pšenice se može mešati (kompatibilnost) sa preparatima na bazi 2,4-D i fluroksipira. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

Plodored:

Nema ograničenja u normalnom plodoredu. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati usevi bez ograničenja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

30 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

tbm 75 WG

herbicid - sredstvo za suzbijanje korova
klorofilne zavisan herbicid (baza žito Koz) (WG)

SASTAV PREPARATA (aktivna supstanca):

Generalni naziv: tribenuron-metil
Hemijski naziv (IUPAC):
metil-2-(4-metoksifenil)-metil-3,5-tiazin-2-il(metilkarbamilsulfonil)benzoat
Sadržaj: 750 g u 25 g/kg
Tehnološka čistoća: min 95 %
CAS Broj: 107333-49-0

Pre primenu sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati etiketu!

Dovoljno za stvaranje u prometu: Riješeno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije Broj: 32/14-1027/018-11 od 21.03.2016. godine i izmena Riješeno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Broj: 32/17-1062/023-11 od 23.11.2017. godine.

Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd, Prime Building Park, Durgamkhil (Joshi) Road, V/8 Park (West), 400066 Mumbai - India.

Distributer: ShardaBilje d.o.o., Vukovog Imenika 12, 11000 Beograd, Srbija.

Uvoznik: Fizikalni d.o.o., Maleskih Gorica 15, 21000 Nova Sada, Srbija.

Distributer: DELTA AGRAR d.o.o., Autoput za Zadar 35, 11000 Novi Beograd, Srbija
Poziv: 11 2000 6000, Kupovina: Sloboda, Šankara, Petarica 60 tel: 031/424-476, ofis@deltagr.hr

Rok trajanja: 3 godine u uslovima pravilnog skladištenja u originalnom netovarenom i neodštećenom pakovanju.
Datum proizvodnje i broj serije su ispisani na pakovanju.

Distributer:
DELTA AGRAR
Sharda Cropchem

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Arylex™ active

PRIMENA:

Viballa™ EC je novi herbicid za primenu posle nicanja zasnovan na inovativnoj aktivnoj materiji Arylex™ active za kontrolu problematičnih širokolisnih korova u usevu suncokreta.

Jedinstveni period primene: od pojave 4 prava lista do početka stadijuma butonizacije (BBCH 14-50) u dozi od 1l/ha.

Primenjuje se u svim hibridima suncokreta: konvencionalnim i tolerantnim prema herbicidima (ExpressSun® i Clearfield®).

Optimalna temperatura vazduha za primenu preparata je od +8 do +25°C.

Ne preporučuje se upotreba preparata **Viballa™ EC** kada su usevi suncokreta u stresu (usled oštećenja biljaka od strane štetočina, bolesti, nedostatka hranjivih materija, prethodno primenjenih preparata, suše ili velikih vrućina, viška vlage u vazduhu i zemljištu, kao i uticaja hladnog vremena i sl.)

Kiša koja padne u roku od jednog sata nakon tretmana može umanjiti efikasnost herbicida.

Utrošak vode je od 200 do 400 l/ha, a maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

SPEKTAR DELOVANJA:

Širokolisni korovi:

- Visoko osetljivi korovi preko 95 % ;

Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), obična pepeljuga (*Chenopodium album*), teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), obična boca (*Xanthium strumarium*), divlji broć (*Galium aparine*).

- Osetljivi 85-94,9%;

Obična pomoćnica (*Solanum nigrum*), štir (*Amaranthus retroflexus*), konoplja (*Cannabis ruderalis*), tatula (*Datura stramonium*).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Molekuli Arylex™ active prodiru u biljku i kreću se po celoj biljci, nakupljajući se u tačkama porasta. Herbicid biljka brzo apsorbuje vezujući ga za specifične receptore auksina u ćelijskom jedru, i baš taj momenat razlikuje Arylex™ active od svih ostalih sintetičkih herbicida na bazi auksina. Vezivanje Arylex™ active za receptore auksina izaziva degradaciju belančevina – represora. Tokom nekoliko časova posle primene herbicida kod biljaka se remeti funkcija rasta. Nakon nekoliko časova pojavljuju se vidljivi znaci propadanja korova, a za 3-5 sedmica u potpunosti se uništavaju.

Aktivni rast osetljivog korova prestaje u roku od jednog dana nakon usvajanja preparata. Nakon 1-2 dana pojavljuju se prvi vidljivi znaci delovanja kod korova, a konačno suzbijanje je 3-5 nedelja nakon tretmana i zavisi od vrste korova i stadijuma njihovog razvoja, broja korovskih biljaka i klimatskih uslova pre i posle tretmana.

NAPOMENE:

- Visok nivo bezbednosti za životnu sredinu NOVI HEMIJSKI SASTAV HERBICIDA Arylex™ active prema mehanizmu delovanja pripada grupi sintetičkih auksina (HRAC, grupa O);
- Efikasno delovanje i pri malim kolčinama primene, brzo prodire u korovsku biljku i ispoljava dejstvo;
- Deluje i u promenljivim vremenskim uslovima (suvo i hladno vreme);
- Najbolja kontrola ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*), čak i prerasle;
- Novo rešenje u borbi protiv rezistentnih korova;
- Bez ograničenja plodoreda.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Viballa™ EC se može primenjivati u raznim programima zaštite useva suncokreta sa ostalim herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Međutim, treba izbegavati kombinaciju sa herbicidima na bazi imazamoksa, koje mogu dovesti do privremene manifestacije fitotoksičnosti. Kada koristite ove aktivne materije u programima zaštite, interval između tretmana mora biti najmanje 10 dana. Takođe treba izbegavati primenu organofosfornih insekticida i kada se koriste preporučuje se interval od 12-14 dana. Ne preporučuje se upotreba preparata **Viballa™** istovremeno sa graminicidima, interval između tretmana je 10 ili više dana.

Zahvaljujući aktivnoj materiji Arylex™ koja pripada novoj klasi hemijskih jedinjenja - arilpikolatinata i po međunarodnoj klasifikaciji ulazi u grupu auksin herbicida (sintetički auksini, Grupa O, klasifikacija HRAC), rizik razvoja rezistencije je definisan kao nizak. Međutim, da bi izbegli svaki potencijalni rizik, treba se pridržavati sledećih preporuka:

- koristiti maksimalno dozvoljenu količinu preparata za kontrolu korova;
- obezbediti normalnu rotaciju poljoprivrednih kultura, plodored;
- primenjivati naizmenično herbicide sa različitim mehanizmima delovanja;
- primenjivati kombinovane programe zaštite useva suncokreta.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FUNGICIDI

DELTA AGRAR
www.deltaagrar.rs

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

250 g/l Azoksistrobin + 750 g/l Fenpropidin

PRIMENA:

AMISTAR® Prime Pack je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje najznačajnijih bolesti lista i stabla pšenice i ječma.

- U usevu pšenice suzbija: pepelnicu (*Erysiphe graminis*), smeđu rđu (*Puccinia recondita*) i sivu pegavost lista (*Septoria tritici*) u količini primene od 0,75 l/ha (**AMISTAR®**) + 0,45 l/ha (**PRIME®**) prema preporuci Prognozno-izveštajne službe, nakon bokorenja: 9 i više stabala vidljivo do pojave lista zastavičara (BBCH 29-37). U slučaju slabijeg intenziteta bolesti u početnim fazama, tretman se može obaviti od faze potpuno razvijenog zastavičara do početka cvetanja i klasanja (BBCH 39-50);
- U usevu ječma suzbija: mrežastu pegavost ječma (*Pyrenophora teres*) i pepelnicu (*Erysiphe graminis*) u količini primene od 0,75 l/ha (**AMISTAR®**) + 0,45 l/ha (**PRIME®**) prema preporuci Prognozno-izveštajne službe, nakon bokorenja: 9 i više stabala vidljivo do pojave lista zastavičara (BBCH 29-37).

Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.

MEHANIZAM DELOVANJA:

AMISTAR® (azoksistrobin) se odlikuje lokal sistemičnim delovanjem, zbog čega se dobro kreće kroz lisno tkivo pa biljku štiti spolja i iznutra. Ometa životni ciklus patogena, klijanje spora i smanjuje rizik od sekundarnih infekcija. **PRIME®** (fenpropidin) brzo prodire u biljku čak i na nižim temperaturama. Pripada grupi piperidina, sprečava biosintezu sterola.

KARENCA:

Pšenica- 35 dana,

Ječam- 42 dana;

Pakovanje: 5 L **Amistar®** + 3 L **Prime®** (proizvod se prodaje u paketu)

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za suspenziju (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

propamokarb 400 g/l + cimoksanil 50g/l

PRIMENA:

AXIDOR je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, primenjuje folijarno za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (*Phytophthora infestans*) u zasadima krompira i paradajza.

Vreme i količina primene:

Primenjuje se u količini od 2,5 l/ha (25 ml/100m²) preventivno, pre pojavljivanja simptoma ili najkasnije 2 dana po pojavi simptoma.

- U zasadu krompira se primenjuje od faze kada je vidljiv prvi izdanak u osnovi (< 5 cm) do faze kada 50% listova poprimi mrku boju (BBCH 21-95);
- U zasadu paradajza se primenjuje od faze kada je vidljivo prvo primarno-sekundarno stablo, do faze kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 21-89).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:

Krompir- četiri tretmana, najmanje 7 dana između tretmana;

Paradajz- tri tretmana, najmanje 7-10 dana između tretmana.

NAPOMENE:

Može se mešati sa većinom drugih preparata. Uraditi test kompatibilnosti sa malom količinom preparata.

KARENCA:

Krompir – 14 dana;
Paradajz – 3 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

ciprodinil 500 g/kg

PRIMENA:

Chorus 50 WG je sistemični, folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog delovanja, koji se primenjuje:

- U zasadu **jabuke**, za suzbijanje prouzrokovača **čadave pegavosti lista i krastavosti ploda** (*Venturia inaequalis*), u koncentraciji **0,03-0,05%**, odnosno **300-500 g** u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do završetka cvetanja (od faze 11 do 51-69 BBCH skale), uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana;
- U zasadu **višnje**, za suzbijanje prouzrokovača **sušenja cvetova, rodni grančica, mrke truleži plodova** (*Monilia laxa*), u koncentraciji **0,03-0,05%**, odnosno **300-500 g** u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od početka cvetanja (10% cvetova otvoreno), pa do fenofaze kada je otvoreno najmanje 50% cvetova, a prve latice opadaju (faze 61-65 BBCH skale). Ukoliko se primenjuje dva puta, tretirati od fenofaze cvetnog balona, pa do kraja cvetanja (faze 59-67 BBCH skale) uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana.

- U zasadu **breskve i šljive**, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodni grančica, (*Monilinia laxa*) u količini od **300-500 g/ha** u 600-1000 l/ha vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od fenofaze cvetnog balona do fenofaze precvetavanja (od 59 do 67 BBCH skale).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ova aktivna materija je inhibitor sinteze proteina gljiva. Aktivna materija ciprodinil prodire unutar tkiva lista i ploda. Ovim se obezbeđuje produženo delovanje bez obzira na vremenske uslove i sprečava ispiranje preparata kišom.

NAPOMENE:

Chorus 50 WG je jedini fungicid koji deluje na niskim temperaturama (preko 5°C) i obezbeđuje pouzdano delovanje u ranim fazama razvoja biljaka zbog čega je nezamenljiv u programu zaštite jabuke u fazama od mišjih ušiju do kraja cvetanja.

Ako se primeni do 48h posle početka zaraze **Chorus 50 WG** deluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci). Suzbijanje bolesti uvek je efikasnije kada se preparat primeni preventivno.

KARENCA:

Višnja, breskva i šljiva – 14 dana;

Jabuka – 28 dana.

PAKOVANJE:

3 g, 30 g, 200 g i 5 kg

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

bakar 190 g/l + trobazni bakar sulfat 345 g/l

PRIMENA:

Cuproxat® je preventivni fungicid na bazi trobaznog bakara sulfata proizveden po najnovijoj tehnologiji, koji se koristi:

- U zasadu **jabuke** u cilju suzbijanja prouzročivača **pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda** (*Venturia inaequalis*): 0,5-0,6% (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije; 0,4-0,45% (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze "mišje uši" (BBCH 54);
- U zasadu **kruške** u cilju suzbijanja prouzročivača **pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda** (*Venturia pyrina*): 0,5-0,6% (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije; 0,4-0,45% (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze "mišje uši" (BBCH 54);
- U zasadu **breskve** u cilju suzbijanja prouzročivača **kovrdžavosti lišća breskve** (*Taphrina deformans*) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (*Stigmina carpophila*): 0,25-0,35% (25-35 ml u 10 l vode), u toku mirovanja vegetacije;
- U ostalom **koštičavom voću**: (šljiva, trešnja, višnja) u cilju suzbijanja prouzročivača **šupljikavosti lišća koštičavog voća** (*Stigmina carpophila*), 0,2% (20 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije;

- U zasadu **vinove loze** u cilju suzbijanja prouzročivača plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) i crvenila lišća vinove loze (*Pseudopeziza tracheiphila*), 0,2-0,35% (20-35 ml u 10 l vode), tretiranjem pri pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze;
- U **hmelju** u cilju suzbijanja prouzročivača plamenjače hmelja (*Pseudoperonospora humuli*): 0,2% (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja;
- U usevima **krompira i paradajza** u cilju suzbijanja prouzročivača plamenjače krompira i paradajza (*Phytophthora infestans*) i prouzročivača crne pegavosti (*Alternaria solani*): 0,2% (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem. Preparat se primenjuje pre klijanja spora prouzročivača biljnih bolesti, preventivno.

NAPOMENE:

Cuproxat® je formulisan po posebnoj tehnologiji proizvodnje ultra malih čestica (najmanje 70% čestica u formulaciji je manje od 1 mikrona). Opšte je poznato da je kod bakarnih preparata od veće važnosti što uniformnija pokrivenost tretiranog lišća nego sama količina preparata. Ova formulacija **Cuproxat®**-a omogućava 100 % pokrivenost tretiranog lišća.

KARENCA:

Krompir i paradajz – 7 dana;
Hmelj – 14 dana;
Stone sorte vinove loze – 21 dan;
Vinske sorte vinove loze – 28 dana;
Voće – obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

200 ml, 1 L i 5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



BLAUVIT

FORMULACIJA:

Kvašljivi prašak (WP)

AKTIVNA MATERIJA:

bakar-hidroksid 770 g/kg

PRIMENA:

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid za preventivni delovanjem. Koristi se u zasadima vinove loze i u usevima šećerne repe.

- U zasadu vinove loze se koristi za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji od 0,35 – 0,4 % (35-40g na 10l vode). Primenjuje se preventivno u fenofazama 11-79 BBCH skale;

Utrošak vode: 600-1000l/ha (6-10 l/100m²)

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku jedne godine.

- U usevu šećerne repe se koristi za suzbijanje pegavosti lista (*Cercospora beticola*) u koncentraciji od 2kg/ha (20g na 100m²). Primenjuje se preventivno u fenofazama 39-49 BBCH skale, u zavisnosti od potrebe.

Utrošak vode: 400 l/ha (4l/100m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je četiri puta u toku jedne godine.

NAPOMENE:

Blauvit se nalazi na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zasada i useva.

KARENCA:

Vinske sorte vinove loze – 28 dana;

Stone sorte vinove loze – 21 dan;

Šećerna repa – 14 dana.

PAKOVANJE:

25g, 250g i 1kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

ditianon 125 g/l + kalijum fosfonat 561 g/l

PRIMENA:

Delan® Pro je fungicid koji se odlikuje odličnim preventivnim delovanjem na prouzrokovaoče oboljenja u jabučastom voću i vinskim sortama vinove loze.

Količina i vreme primene:

- U zasadu jabuke se primenjuje u količini od 2,5 l/ha od faze kada je vidljiv zeleni listić koji okružuje cvetove pa do početka zrenja (BBCH 53-81);
- U zasadu vinske sorte vinove loze se primenjuje u količini od 3-4 l/ha od faze kada je cvast jasno vidljiva do faze šarka bobica (BBCH 53-83).

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasno suzbija prouzrokovaoče: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabučastog voća (*Venturia* spp.), crne pegavost vinove loze (*Phomopsis viticola*), plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*), crne truleži vinove loze (*Guignardia bidwellii*).

KARENCA:

Jabučasto voće – 35 dana;

Vinske sorte vinove loze – 42 dana.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

100 g/l Revysol® (mefentrifluconazole), 150 g/l Kresoksim-metil

PRIMENA:

Duett® Turbo je sistemični fungicid širokog spektra delovanja koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovaca bolesti žitarica. Koristi se u usevima:

Pšenice: za suzbijanje prouzrokovaca sive pegavosti lista (*Septoria tritici*) smeđe lisne rđe (*Puccinia tritici*), žute rđe (*Puccinia striiformis*), pepelnice (*Erysiphe graminis*), žuto-smeđe pegavosti (*Pyrenophora tritici-repentis*), poleganja (*Oculmacula yallundae*), paleži klasa (*Fusarium* sp.) u fenofazi između početka vlatanja i kraja cvetanja pšenice (BBCH 30-69) u količini od 0,6-1 L/ha (6-10 ml na 100m²);

Ječma: za suzbijanje prouzrokovaca mrežaste pegavosti (*Pyrenophora teres*) i pepelnice (*Blumeria graminis*) u fenofazi od početka vlatanja do faze kada je vidljivo prvo osje (ako osje postoji) (BBCH 30-49)* u količini primene od 0,6-1 L/ha (6-10 ml na 100m²).

Raži: za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Blumeria graminis*) i smeđe rđe (*Puccinia recondita*) u fenofazi od početka vlatanja do kraja cvetanja (BBCH 30-69) u količini primene od 0,6-1 L/ha (6-10 ml na 100m²)

Tritikalea: za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Blumeria graminis*), sive pegavosti lista (*Septoria tritici*), smeđe rđe (*Puccinia recondita*), žute rđe (*Puccinia striiformis*) u fazi od početka vlatanja do kraja cvetanja (BBCH 30-69) u količini primene od 0,6-1 L/ha (6-10 ml na 100m²).

Utrošak vode: 100-300 l/ha.

Duett® Turbo je novi predstavnik Revysol® tehnologije sa jedinstvenim FlexyPOWER molekulom koji omogućava i do 100 puta snažnije vezivanje za patogen. Zahvaljujući ovoj osobini osigurana je efikasnost koja je bez premca čak i u uslovima kada u polju imamo prisutnu rezistenciju.

Perfektna preventivna zaštita - kristalne zalihe na površini lista sprečavaju klijanje patogena. Stabilna efikasnost u svim uslovima proizvodnje. Produženo delovanje – zahvaljujući postepenom usvajanju obezbeđena je dugotrajna zaštita i smanjen je stres koji se može javiti usled brzog usvajanja preparata. Izvanredna kompatibilnost prilikom mešanja s drugim sredstvima za zaštitu bilja. Omogućeno je dodatno delovanje kroz takozvanu „gasnu fazu“ – na taj način dodatno štitimo i one delove biljaka koji nisu zahvaćeni prskanjem, odnosno novi porast.

MECHANIZAM DELOVANJA:

Mefentriflukonazol je aktivna supstanca iz grupe triazola. Inhibira delovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u ćelijskim membranama. Širokog je spektra delovanja. U biljci se premešta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Deluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno delovanje. (FRAC kod: 3).

Aktivna materija kresoksim-metil je iz grupe strobilurina. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji mitohondrijalne respiracije, preko blokiranja transfera elektrona, čime se sprečava proizvodnja energije kod gljiva. Kresoksim-metil je lokalsistemik i u biljci ima translaminarno kretanje sa lica na naličje lista. Zato ga treba primenjivati preventivno ili u ranim fazama u ciklusu bolesti. Fungicidnu aktivnost ispoljava kroz inhibiranje klijanja spora i sporulacije kao i u ranom porastu micelije, dok na miceliju unutar biljnog tkiva ima slabiju efikasnost.

NAPOMENE:

U uslovima koji pogoduju bolesti i/ili kod velike infekcije treba koristiti najveću preporučenu dozu.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini 2 puta u toku vegetacije sa vremenskim razmakom od 14 dana, ako se prvi put primenjuje kada je vidljivo prvo osje, razmak između tretiranja treba da bude najmanje 21 dan.

Radna karenca dok se depozit preparata ne osuši.

Kompatibilnost - ne predlaže se ni jedno mešanje različitih proizvoda u rezervoaru.

Pripremljeni rastvor sredstva za zaštitu bilja upotrebiti istog dana.

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Za sprečavanje razvoja rezistentnosti koristiti sredstva sa različitim mehanizmima delovanja.

KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE:

1L, 5L.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FALCON FORTE

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

spiroksamin 224 g/l + tebukonazol 148 g/l +
protiokonazol 53 g/l

PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA:

FALCON FORTE se koristi u usevima pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača:

- pepelnice (*Erysiphe graminis*) pšenice i ječma, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas;
- rđe (*Puccinia* spp.) pšenice, primenom tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita, odnosno tokom postojanja uslova za širenje parazita;
- sive pegavosti lista i klasa (*Septoria tritici*) pšenice, primenom po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita;
- paleži klasa (*Fusarium* spp.) pšenice i ječma, pred kraj klasanja i početkom cvetanja;
- mrežaste pegavosti lista ječma (*Pyrenophora teres*) po pojavi simptoma i postojanju uslova za njihovo širenje.

Količina primene je od 0,7 -1 l/ha (7 -10 ml/100 m²).

Utrošak vode: 200 -400 l/ha (2-4 l/100m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat **FALCON FORTE** sadrži tri aktivne materije sistemskog delovanja.

Protiokonazol je izuzetno delotvoran u suzbijanju prouzrokovača velikog broja biljnih bolesti, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa u usevima strnih žita. Zajedno sa tebukonazolom inhibira sintezu ergosterola u ćelijama gljive i ispoljava preventivno, kurativno i eradikativno delovanje.

Spiroksamin deluje kao inhibitor biosinteze sterola i odlikuje se sposobnošću brzog prodiranja u list, čime omogućava drugim dvema materijama da brže dođu do mesta delovanja i tako povećava njihovu efikasnost.

NAPOMENE:

Ispitivanja su dokazala da ne postoji mogućnost ukrštene rezistencije sa preparatima na bazi triazola i strobilurina.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

pirimetanil 250 g/l + ditianon 250 g/l

PRIMENA:

Faban® je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, **namenjen zaštititi jabuke od čađave krastavosti lista i ploda** (*Venturia inaequalis*). Tretiranje se obavlja tokom perioda primarnih zaraza, od fenofaze mišjih ušiju do fenofaze kada su plodovi oko 70% od krajnje veličine, a količina primene je od **1,2-1,6 l/ha**.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Ditianon je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, dok pirimetanil pripada anilinpirimidinima i po mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze proteina.

DODATNI BENEFITI:

Ono što izdvaja preparat **Faban®** jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF adjuvanta, 100 % ditianona i 67 % pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku. Preostalih 33 % pirimetanila rastvoreno je u adjuvantu.

Ključne prednosti ove formulacije su:

- **produženo preventivno delovanje** - u slučaju Fabana, nakon 4 dana ostaje više od 60%

pirimetanila zahvaljujući ko-kristalnoj strukturi koja sprečava brzo isparavanje. Ditianon ostaje čvrsto vezan u ko-kristalu, čime se još teže spira kišom;

- Širi okvir za primenu - bitan nedostatak pirimetanila i drugih anilinopirimidina jeste slabo delovanje na višim temperaturama, što se takođe menja kod Fabana. Ko-kristal sprečava naglo isparavanje, pa je i delovanje na višim temperaturama znatno bolje nego kod solo proizvoda;
- Izuzetne osobine – **Faban®** ima povratno delovanje (48 h “unazad”). Razlog je u 33% “slobodnog” pirimetanila koji je zapravo rastvoren u adjuvantu čime dobija dodatnu brzinu i snagu u sprečavanju infekcije. Dobro je poznato da je **Delan** najotporniji preventivni fungicid na spiranje kišom i pri padavinama od 20 mm nema razlike između **Fabana** i tank-mixa, ali pri 40 mm kiše nakon tretmana razlika je značajna u korist Fabana.

KARENCA:

56 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncetrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJAI:

kaptan 480 g/l

PRIMENA:

Nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se u zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovala pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (*Venturia inaequalis*).

Primenjuje se preventivno tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, kada su jabuke u fazi 10-78 BBCH skale u količinama primene od 2,5 l/ha. Primenjuje se folijarno.

Utrošak vode: 1000 l/ha (1l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je četiri puta u toku godine.

NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati u zasadima jabuke sorte Crveni delišes.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos), bordovskom i sumporno-krečnom čorbom, kao ni sa uljanim i EC formulacijama.

Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na višim temperaturama u kombinaciji sa preparatima na bazi dimetoata.

KARENCA:

21 dan.

PAKOVANJE:

1L, 5L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

200 g/l Dimoksistrobin, 200 g/l Boskalid

PRIMENA:

Dvokomponentni premium fungicid sa aktivnim sastojcima različitog mehanizma delovanja. Visoko efikasan protiv bolesti uključujući sklerocijniju.

Koristi se u usevima:

Suncokreta: za suzbijanje prouzrokovala sive truleži (*Botrytis cinerea*) i prouzrokovala bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) u količini primene 0,3 - 0,5 l/h (3 - 5 ml na 100 m²), preventivnim tretiranjem pre sticanja uslova zaraze, prvo tretiranje tokom fenofaze butona (BBCH 55-59), drugo tretiranje u fenofazi punog cvetanja (BBCH-65), uz utrošak vode za tretiranje sa zemlje 400 l/ha (4 l na 100 m²), za tretiranje iz vazduhoplova 70 - 80 l/ha;

Uljane repice: za suzbijanje prouzrokovala bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), crne pegavosti (*Alternaria brassicae*) i truleži (*Phoma lingam*) u količini primene 0,3 - 0,5 l/h (3 - 5 ml na 100 m²), tretiranjem pre i posle cvetanja (faze 31-51 i 61-69 BBCH skale), uz utrošak vode za tretiranje sa zemlje 400 l/ha (4 l na 100 m²), za tretiranje iz vazduhoplova 70 - 80 l/h

MEHANIZAM DELOVANJA:

Boskalid pripada hemijskoj grupi karboksamida. Najveća efikasnost njegove upotrebe postiže se tokom preventivnih tretmana. Deo aktivne materije ostaje na površini biljke, drugi prodire unutra, širi se translaminarno i akropetalno kroz vaskularni sistem lista. Mehanizam delovanja

boskalida je inhibicija sukcinat dehidrogenaze u mitohondrijskom lancu transporta elektrona. Boskalid blokira ključnu fazu ćelijskog disanja u kompleksu II, zbog čega je poremećen metabolizam patogena. Boskalid inhibira klijanje spora, blokira stvaranje apesorija. Kod nekih gljiva utiče i na razvoj micelija i spora. Dimoksistrobin blokira prenos elektrona u respiratornom lancu u mitohondrijama gljiva.

NAPOMENE:

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Plodored: Nema ograničenja.

Mogućnost mešanja: Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, endosulfana i hlorspirifosa.

KARENCA:

Suncokret i uljana repica: 28 dana.

PAKOVANJE:

1L i 5 L.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

75 g/l Revyvit® (mefentrifluconazole)

FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA:

Revyvit® je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe (*Cercospora beticola*) u fenofazi od potpunog zatvaranja redova (oko 90% biljaka zatvorilo red) dok koren ne dostigne veličinu za vađenje (fenofaze 39-49 BBCH skale).

Količina primene: 1,5 L/ha (15ml/100 m²).

Utrošak vode: 100-400 L/ha (1-4 L/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne vegetacione sezone: 2 puta sa intervalom od 14 dana između dva tretmana.

Prednosti:

Brzo i efikasno delovanje u uslovima intenzivnog širenja infekcije.

Minimalan rizik od spiranja kišom.

Veća otpornost od degradacije usled UV zračenja.

Superiorna formulacija omogućava otpornost i stabilnost preparata u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.

Revyvit® usvaja 24x brže u poređenju sa standardnim triazolima.

Nakon usvajanja, **Revyvit®** formira "skladišta" u unutrašnjosti lista iz kojih se preparat dalje širi i pruža brzu i potpunu zaštitu lisne mase.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Mefentriflukonazol je aktivna supstanca iz grupe triazola. Inhibira delovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u

ćelijskim membranama. Širokog je spektra delovanja. U biljci se premešta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Deluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno delovanje. (FRAC kod: 3).

NAPOMENE:

Fungicid **Revyvit®** uvek primenjivati u kombinaciji sa nekim kontaktnim preparatom. U drugim tretmanima primeniti fungicide na bazi epoksikonazola, protikonazola ili difenokonazola u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom. Radna karenca: 48 h. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA:

Šećerna repa- 28 dana.

PAKOVANJE:

5 L.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

150 g/l piraklostrobin + 75 g/l **Xemium®** (fluksapiroksad)

PRIMENA:

Priaxor® EC je sistemični fungicid za zaštitu pšenice od rđe, pepelnice, kao i pegavosti lista. Izuzetno efikasan u suzbijanju mrežaste i sive pegavosti i ramularije u ječmu. Čini ga jedinstvena kombinacija SDHI i strobilurina.

Priaxor® EC se koristi kao sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u usevima:

Pšenice (ozima, jara, durum i spelta) za suzbijanje: pepelnice (*Erysiphe graminis*), sive pegavosti lista (*Septoria tritici*), bolesti stabljike (*Helminthosporium sativum*), lisne rđe žita (*Puccinia striiformis*);

Ječma (ozimi i jari) za suzbijanje: mrežaste pegavosti ječma (*Pyrenophora teres*), pegavosti lista ječma (*Rhynchosporium secalis*), ramularijske pegavosti (*Ramularia collo-cygni*);

Raži (ozima), za suzbijanje: pegavosti lista (*Rhynchosporium secalis*), lisne rđe (*Puccinia recondita*);

Tritikalea, za suzbijanje: pepelnice (*Erysiphe graminis*), sive pegavosti lista (*Septoria tritici*), lisne rđe pšenice (*Puccinia recondita*).

Utrošak vode: 100-300 l/ha.

Količina primene: 0,75-1,5 L/ha (7,5-15 mL na 100m²).

Vreme primene: Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faza BBCH 25 – 69 skale).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Dva puta.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Kombinacija dve aktivne supstance, potpuno nove, Fluksapiroksad - **Xemium®** (75 g/l) iz grupe SDHI inhibitora (inhibitora sukcinat dehidrogenaze) i strobilurina Piraklostrobin (150 g/l) iz grupe QoI inhibitora (inhibitora respiracije). **Xemium®** se zahvaljujući brzom sušenju i pravilnoj depozita čvrsto vezuje za voštani sloj kutikule zbog čega se teško spira kišom. Depoziti u vidu kristala omogućavaju da se **Xemium®** ravnomerno usvaja i kreće kroz biljku, potpuno nezavisan od vremenskih uslova.

NAPOMENE:

Pored fungicidnog delovanja **Priaxor® EC** ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke, tako što poboljšava kondiciono stanje biljke, priprema biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova, uključujući i napad štetnih organizama, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore - AgCelence® efekat. Pruža efikasnu zaštitu u blok tretmanu (10 do 14 dana između aplikacija). Deluje na veliki broj patogenih gljiva (*Pseudocercospora*, *Pyrenophora*, *Rhynchosporium*, *Septoria*, *Erysiphae*).

KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



PROPULSE® 250 SE

FORMULACIJA:

Suspo – emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA:

fluopiram 125 g/l + protiokonazol 125 g/l

PRIMENA:

PROPULSE® 250 SE se primenjuje folijarno u usevima:

- **šećerne repe**, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (*Cercospora beticola*) od zatvaranja redova do dostizanja veličine korena za vađenje (31 - 49 BBCH skale) u količini primene od 1,0-1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²). Sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja;
- **uljane repice** - za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), sive truleži (*Botrytis cinerea*) i crne pegavosti (*Alternaria* spp.), od fenofaze razvoja lista do formiranja ploda (14 - 73 BBCH skale) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²);
- **suncokreta** za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), sive truleži (*Botrytis cinerea*), crne pegavosti (*Alternaria* spp.) i pegavosti suncokreta (*Phomopsis helianthi*), od faze 7 listova do kraja cvetanja (BBCH 16 – 69) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) i uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²);
- **soje** za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), i pegavosti (*Phomopsis* spp.), od početka cvetanja do formiranja ploda (BBCH 59 – 75) u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

PROPULSE® 250 SE sadrži dve aktivne materije različitih mehanizama delovanja. Fluopiram je aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida koja deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, fluopiram negativno utiče na porast micelije kao i na klijanje spora, sprečavajući na taj način širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, a mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

NAPOMENE:

Fungicid **PROPULSE® 250 SE** je kompatibilan sa većinom sredstava za tretiranje useva šećerne repe, ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja.

Radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemskih fungicida, preporučuje se kombinovanje sa kontaktnim preparatima na bazi hlorotalonila.

KARENCA:

Šećerna repa- 14 dana;

Suncokret- 28 dana;

Soja i uljana repica- 56 dana.

PAKOVANJE:

1 L i 5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

fosetil-aluminijum 666,7 g/kg + fluopikolid 44,4 g/kg

PRIMENA:

Profiler® je sistemski fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*). Koristi preventivno pre pojave simptoma, od početka cvetanja (faza 53 BBCH skale) pa do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (faza 73 BBCH skale). Količina primene je 2,25 - 3,0 kg/ha (22,5 - 30 g/100 m²).

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6 - 10 l/ 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine, sa razmakom od 10 -14 dana između dva tretiranja.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Fosetil-aluminijum je sistemski komponenta koja se usvaja listom, a zatim se kroz sprovodne sudove biljke kreće u oba smera – i ka korenu i ka vršnim delovima. Ova aktivna materija deluje dvojako-neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.

Fluopikolid je drugi sastojak ovog fungicida i biljka ga usvaja na isti način. Ova aktivna materija ima svojstvo translaminarnog kretanja (od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše). Fluopikolid ima izraženo delovanje na

sve gljive iz klase Oomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se parazit širi), zatim na klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna odlika fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.

Profiler®, kao spoj dve različite aktivne materije, pruža izuzetne mogućnosti za prevenciju bolesti (preventivno delovanje), ali i sprečavanja daljeg razvoja bolesti kod primene na samom početku (kurativno delovanje – 48 h posle nastanka infekcije kod vinove loze). Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Jedna od prednosti ovog proizvoda je upravo efikasnost koju ispoljava i protiv svih sojeva gljiva koje su pokazale otpornost (rezistentnost) na neke grupe fungicida.

NAPOMENE:

Razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovala plamenjače. Pri izuzetno povoljnim uslovima za razvoj bolesti smanjiti rok između tretmana, u protivnom, razmak od 14 dana je dovoljan; Preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;

Preporučljivo je da tretmanu fungicidom **Profiler**[®] prethodi primena fungicida **Mikal Flash**, tako da u bloku od 2-3 tretmana ponavljamo primenu fosetil-aluminijuma;

Ukoliko je tokom vegetacije protiv pepelnice izvršen jedan tretman fungicidom na bazi fluopirama, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata **Profiler**[®] (najkasnije do faze 73 BBCH skale).

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), alkalnim preparatima, preparatima na bazi fluopirama, bordovskom čorbom i nekim folijarnim sredstvima za ishranu bilja.

KARENCA:

21 dan.

PAKOVANJE:

1kg i 12kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

100 g/l Revysol, 100 g/l Piraklostrobin

PRIMENA:

Revycare® je sistemični fungicid koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u usevima:

Pšenice (ozima, jara): za suzbijanje (*Puccinia recondita*) lisne rđe, (*Puccinia striiformis*) žute rđe, (*Septoria tritici*) sive pegavosti lista, (*Erysiphe graminis*) pepelnice, (*Fusarium spp.*, *Microdochium nivale*) fuzarioza;

Ječma (ozimi i jari): za suzbijanje (*Pyrenophora teres*) mrežaste pegavosti lista, (*Rhynchosporium secalis*) okruglaste pegavosti lista, (*Ramularia colloctygni*) ramulariozne pegavosti lista i (*Erysiphe graminis*) pepelnice;

Raži (ozima): za suzbijanje (*Puccinia recondita*) lisna rđe, (*Rhynchosporium secalis*) okruglasta pegavosti lista;

Tritikalea: za suzbijanje (*Puccinia recondita*) lisne rđe, (*Septoria tritici*) sive pegavosti lista;

Ovsa: za suzbijanje (*Erysiphae graminis*) pepelnice.

Količina primene: 0,75 - 1,5 l/ha

Vreme primene: Sredstvo se primenjuje u razdoblju kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti, od početka izduživanja stabljike (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69).

Potpuna zaštita pšenice i ječma od svih bolesti. Prilagođen za bilo koji rok primene. Zaustavlja bolest i nakon infekcije. Najdugotrajnija zaštita

lista. Efikasan i na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i ispiranje kišom.

Revycare® sadrži jedinstveni triazol Revysol® sa FlexyPower molekulom koji se i do 100x jače veže za patogen u poređenju sa standardnim triazolima. FlexyPower molekul ima jedinstvenu "izopropanol kariku" koja osigurava fleksibilnost i lako se prilagođava patogenu. Zahvaljujući ovoj osobini, Revysol® garantuje efikasnost koja je bez premca, čak i u uslovima kada se u polju javlja rezistencija.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Sredstvo **Revycare®** sadrži aktivne supstance mefentriflukonazol i piraklostrobin. Mefentriflukonazol je aktivna supstanca iz grupe triazola. Inhibira delovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u ćelijskim membranama. Širokog je spektra delovanja. U biljci se premešta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Deluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno delovanje. (FRAC kod: 3). Piraklostrobin je aktivna supstanca iz grupe strobilurina. Inhibira mitohondrijsko disanje kod gljiva. U biljci se premešta uzlaznim tokovima (akropetalno). Kombinuje se sa drugim aktivnim supstancama, koje upotpunjuju njegovo delovanje i umanjuju rizik od rezistentnosti. Koristi se preventivno. (FRAC kod: 11). Preparat se koristi u jednom vegetacionom periodu, u zavisnosti od opasnosti od infekcije, jednom ili dva puta. Rana pojava bolesti opravdava tretiranje od početka rasta stabljike. Kasnije se tretiranje vrši u periodu od klananja do kraja perioda cvetanja, koji pruža zaštitu od pojave bolesti koje ugrožava gornje listove i klas. U okolnostima prosečne infekcije opravdano je tretiranje manjim dozama, dok u okolnostima

koji pogoduju infekciji opravdano je tretiranje većim dozama. Zaštitu od fuzarioze klasa treba sprovesti ciljano, na početku perioda cvetanja sa dozama od 1,0-1,5 l/ha, uz obezbeđenje ujednačene pokrivenosti klasa sredstvom za prskanje. Ako se prvo tretiranje preparatom vrši nakon otvaranja rukavca zastavičara (BBCH 47), u tom slučaju do sprovođenja eventualnog drugog tretmana treba da protekne najmanje 21 dan.

NAPOMENE:

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Dva puta na istoj površini sa razmakom od 14-21 dan između tretmana u toku godine. Avio tretiranje nije dozvoljeno.


KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE:

1l, 5 l.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Xemium® 300 g/l

PRIMENA:

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog delovanja. Deluje tako što sprečava deobu spora i razvoj infekcije. Zbog aktivne supstance, **Sercadis®** najbrže i najefikasnije stiže do cilja u odnosu na druge SDHI fungicide. Inhibitor je sukcinat dehidrogenaze.

Količina primene:

U zasadima jabuke i kruške: 0,25-0,3 l/ha

U zasadima vinove loze: 0,15 l/ha

Vreme primene:

Za **jabuku:** optimalna faza primene je od momenta kada su prvi listovi vidljivi (faza mišje uši) i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78). Treba izbegavati kurativno delovanje na "venturiju" (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja ali ne više od tri puta u sezoni. Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Za **krušku:** tretman **Sercadis®**-om se obavlja od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (BBCH 53-81).

Za **vinovu lozu:** od fenološke faze kada je otvoren prvi list do početka zrenja bobica (BBCH 11-83). U zavisnosti od vremenskih prilika, interval između tretiranja treba da bude najmanje 10 dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Sercadis® efikasno suzbija prourokovače: pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*), čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke i kruške (*Venturia inequalis* i *Venturia pyrina*), pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*).

KARENCA:

35 dana.

PAKOVANJE:

300 ml i 1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Bakar (Cu) iz bakar-oksihlorida 375 g/kg

PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA:

U zasadu vinove loze suzbija prouzročivača plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m²) preventivnim tretiranjem od početka cvetanja (od faze 53 BBCH skale), a pre ostvarenja uslova za zaraze.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: nije ograničen (prema potrebi)

NAPOMENE:

- Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama sa izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;
- Pri upotrebi sredstva za zaštitu bilja NEORAM® 37,5 WG uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primene Cu (bakra) po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg.

PREDNOSTI:

- Vodotopive granule obezbeđuju odličnu topljivost rastvora bez taloga u rezorvoaru prskalice i ravnomerniju raspodelu po tretiranoj površini
- Veće je postojanosti u odnosu na neke druge oblike bakrova, težeg spiranja depozita pa samim tim i dužeg delovanja
- Višestruk mehanizam delovanja ne dozvoljava razvoj rezistentnosti gljive na fungicid

KARENCA:

Vinova loza – 28 dana.

PAKOVANJE:

1 kg, 10 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJIA:

azoksistrobin 250 g/l

PRIMENA:

Quadris® je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

- U zasadu **vinove loze** suzbija: plamenjaču (*Plasmopara viticola*), pepelnicu (*Uncinula necator*) u količini primene od 0,75 l/ha tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj;
- U zasadu **maline** suzbija: sušenje lastara (*Dydimella appplanata*) u količini primene od 0,75 l/ha preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm i kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja;
- U zasadu **jagode** suzbija: sivu pegavost lista (*Mycosphaerella fargariae*) u količini primene od 0,75 l/ha preventivno, do početka zrenja i nakon berbe;
- U usevu **krompira** suzbija: plamenjaču (*Phytophthora infestans*), crnu pegavost (*Alternaria solani*) u količini primene od 0,75 l/ha preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja;
- U usevu **paradajza** suzbija: plamenjaču (*Phytophthora infestans*), crnu pegavost (*Alternaria solani*) u količini primene od 0,75 l/ha preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja;
- U usevu **krastavca** suzbija: plamenjaču (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini primene od 0,75 l/ha preventivno, od faze 2 prava lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana;
- U usevu **mrkve** suzbija: crnu pegavost lista (*Alternaria dauci*), pepelnicu (*Erysiphae heraclei*) u količini primene od 1 l/ha u fazi prvi pravi list razvijen do završen rast, kada je postignuta forma i veličina korena;
- U usevu **cvekla** suzbija: pegavost lista (*Cercospora* spp.) u količini primene od 1 l/ha po pojavi prvih simptoma.

Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija azoksistrobin se odlikuje lokalsistemičnim delovanjem, što joj omogućava ravnomerno raspoređivanje u biljnom tkivu nakon tretmana. Deluje inhibitory na proces ćelijskog disanja patogena, sprečavajući tako sporulaciju i formiranje plodonosnih tela.

NAPOMENE:

Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima.

KARENCA:

Vinova loza- 21 dan;
Malina- 10 dana;
Jagoda- 3 dana;
Krompir- 14 dana;
Pradajz- 3 dana;
Krastavac- 4 dana;
Mrkva- 7 dana;
Cvekla- 14 dana.

PAKOVANJE:

1 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

metrafenon 500 g/l

PRIMENA:

Vivando® je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*) u količinama primene od 0,015 – 0,020 %. Primenjuje se preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista (BBCH 13) do fenofaze šarka bobice (BBCH 83).

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6 –10 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je tri puta u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Vivando® sa aktivnom supstancom metrafenon ima potpuno drugačiji mehanizam delovanja u odnosu na aktivne supstance koje se nalaze u ostalim preparatima za zaštitu vinove loze od pepelnice, zato je idealan preparat za borbu protiv rezistencije.

NAPOMENE:

Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja vodom se maksimalno iskoristi sadržaj upotrebljenog sredstva.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Vivando® se može mešati sa većinom fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

KARENCA:

28 dana.

PAKOVANJE:

100 ml

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

BASF
We create chemistry

Vivando®
Fungicid

PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU
DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI
I ŽIVOTNU SREDINU.

Vivando® se koristi kao preventivni
i kurativni fungicid za suzbijanje
prouzrokovača pepelnice vinove loze.
U obliku je koncentrovane suspenzije (SC).

100 ml

CYFLAMID 5 EW

FORMULACIJA:

Emulzija ulje u vodi (EW)

AKTIVNA MATERIJIA:

ciflufenamid 50 g/l

PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA:

CYFLAMID 5 EW je fungicid koji se koristi za suzbijanje pepelnice u zasadu vinove loze (*Uncinula necator*) i jabuke (*Podosphaera leucotricha*).

Jabuka: tokom vegetacije, od kada su prvi listovi otvoreni (BBCH 11), do drugog opadanja plodova (BBCH 73);

Vinova loza: tokom vegetacije, kada je prvi list razvijen i pojavljuje se iz začetka lastara (BBCH 11), do faze kada su bobice veličine graška, a grozdovi obešeni (BBCH 75).

Primenjuje se u količini od 0,5 l/ha (5ml na 100m²), uz utrošak vode od 600 do 1000 l/ha (2 do 4 l na 100 m²).

Način prskanja i količinu vode treba izabrati tako da se u zavisnosti od visine i gustine biljaka, mogu ovlažiti svi delovi biljke.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini, u razmaku od 10 do 14 dana.

KARENCA:

Vinova loza - 21 dan;

Jabuka - 14 dana.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Fenpikoksamid 50 g/l + protiokonazol 100 g/l

PRIMENA:

Univoq™ novi fungicid za žitarice širokog spektra s jedinstvenim mestom delovanja za kurativnu i postojanu zaštitu od svih sojeva Septorije i drugih bolesti. Primenjuje se u usevima pšenice, tritikalea, spelte. Koformulacija fungicida i Inatreq™ active sa isprobanim i pouzdanim protiokonazolom, koji obezbeđuje upravljanje rezistencijom za obe aktivne supstance, istovremeno pružajući snažnu kontrolu bolesti širokog spektra. Koristeći patentiranu tehnologiju i-Q4™, obezbeđuje skoro 100% pokrivenosti lista i nudi dugotrajnu zaštitu kao rezultat zadržavanja na voštanoj prevlaci lista.

Primenjuje se u usevima:

Pšenice, Triticalea i Spelte za suzbijanje prouzrokovača:

Lisne rđe pšenice (*Puccinia recondita sp. tritici*), žute rđe pšenice (*Puccinia striiformis*), žuto-smeđa pegavosti lista (*Pyrenophora tritici*), pepelnice (*Erysiphe graminis*), truleži (*Fusarium spp.*), sočivaste pegavosti stabla (*Oculimacula yallundae*) sinonim *Pseudocercospora herpotrichoides*.

Količina primene: 2,0 l/ha (20 ml na 100 m²)
Utrošak vode: 150-300 (1,5 – 3 l na 100 m²);

Vreme primene: početak rasta stabljike do kraja cvetanja (BBCH 30-69).

Pšenice za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista i klasa (*Septoria tritici*);

Količina primene: 1,5 l/ha (15 ml na 100 m²)
Utrošak vode: 150-300 (1,5 – 3 l na 100 m²);

Vreme primene: početak rasta stabljike do kraja cvetanja (BBCH 30-69).

Raži za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (*Erysiphe graminis*), mrežasto okruglaste pegavosti (*Rhynchosporium secalis*), rđe (*Puccinia recognita*), truleži (*Fusarium spp.*)

Količina primene: 2,0 l/ha (20 ml na 100 m²)
Utrošak vode: 150-300 (1,5 – 3 l na 100 m²);

Vreme primene: početak rasta stabljike do kraja cvetanja (BBCH 30-69).

Količina vode 150 – 300 litara.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Inatreq™ active ima jedinstveno mesto delovanja za fungicide u žitaricama i obezbeđuju stabilnu i robusnu kontrolu Septorije, uključujući sojeve otporne na druge mehanizme delovanja. **Univoq™** je kombinacija dve aktivne supstance sa različitim mehanizmom delovanja, ali kako bi se dodatno zaštitili od pojave rezistentnosti, **Univoq™** će biti odobren samo za jednu primenu u sezoni.

INSEKTICIDI

DELTA AGRAR
www.deltaagrar.rs

ASHETA

FORMULACIJA:

Vodorastvorljive granule (SG)

AKTIVNA MATERIJA:

acetamiprid 200g/kg

PRIMENA:

ASHETA je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje smotavca (*Cydia pomonella*) u zasadu jabuke i za suzbijanje zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) u usevu krompira.

U zasadima jabuke, za suzbijanje smotavca (*Cydia pomonella*), primenjuje se u koncentraciji od 0,025% (2,5g u 10l vode) tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica, odnosno 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira na feromonskim klopakama;

U usevu krompira, za suzbijanje zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*), primenjuje se u količini od 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²) tretiranjem kada dominiraju mlađi uzrasti larvi.

Primenjuje se folijarno, prskanjem ili orošavanjem.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²) za jabuku i 200-400 l/ha (2-4l/100 m²) za krompir.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

NAPOMENE:

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na acetamiprid i ukrštene rezistentnosti ne primenjujati alternativno preparate na bazi neonikotinida (imidakloprid, tiakloprid, tiametoksam).

Sredstvo primenjivati samo posle cvetanja zasada jabuke.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Može se mešati sa preparatim neutralne i slabo kisele reakcije.

Nemogućnost mešanja sa preparatima alkalne reakcije, bakarnim fungicidima i sredstvima na bazi dodina.

KARENCA:

Jabuka- 28 dana;

Krompir- 14 dana.

PAKOVANJE:

1kg i 20kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



KRAFT 1.8 EW

FORMULACIJA:

Emulzija ulje u vodi (EW)

AKTIVNA MATERIJA:

abamektin 18 g/l

PRIMENA:

Preparat **KRAFT 1,8 EW** je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Koristi se u zasadu/usevu:

- jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (*Panonychus ulmi*) u koncentraciji 0,075 – 0,10% (7,5 – 10 ml u 10 l vode), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi;
- kruške za suzbijanje kruškine buve (*Cacopsylla pyri*) u koncentraciji 0,10% (10 ml u 10 l vode), u vreme masovnog piljenja larvi;
- maline za suzbijanje eriofidne grinje maline (*Phyllocoptes gracilis*) u koncentraciji 0,075 – 0,10% (7,5 – 10 ml u 10 l vode), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi;
- krastavca za suzbijanje običnog paučinara (*Tetranychus urticae*) u koncentraciji 0,05 – 0,10% (5 – 10 ml u 10 l vode), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi.

KARENCA:

Jabuka, kruška i malina - 14 dana;

Krastavac - 21 dan.

PAKOVANJE:

100 ml i 1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



DECIS® EXPERT

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

deltametrin 100 g/l

PRIMENA:

Decis® Expert je nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog delovanja širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

Koristi se u usevima:

- **pšenice**, za suzbijanje žitne pijavice (*Oulema malanopus*) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²) po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata;
- **kukuruza**, za suzbijanje kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) i kukuruzne sovce (*Helicoverpa armigera*) u količini primene 0,075 - 0,125 l/ha (0,75 – 1,25 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza;
- **uljane repice**, za suzbijanje repičinog sjajnika (*Meligethes aeneus*) u količini primene 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova (BBCH 55 - 60);
- **lucerke**, za suzbijanje lucerkine bube (*Phytodecta fornicata*) u količini primene od 0,05 do 0,075 l/ha (0,5 - 0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem posle pojave imaga;

- **suncokreta**, za suzbijanje biljnih vaši (*Aphididae*) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 300-600 l/ha (3-6 l/m²), tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina (BBCH 12-78);
- **višnje**, za suzbijanje trešnjine muve (*Rhagoletis cerasi*) u količini primene 0,175 l/ha (1,75 ml/100 m²) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l/m²) Tretiranje vršiti u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda (fenofaza BBCH 80), prskanjem ili orošavanjem;
- **graška** (mali usev i manje značajna namena), za suzbijanje graškovog savijača (*Cydia nigricana*), u količini primene 63 ml/ha (0,63 ml/100 m²), po pojavi štetnih insekata, kada se dostigne prag ekonomske štete; utrošak vode je 400 l/ha (40 l/m²);

Maksimalan broj tretiranja u toku godine, na istoj površini je jednom u usevima pšenice, suncokreta, graška i u zasadu višnje, odnosno dva puta u usevima kukuruza, uljane repice i lucerke.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivnu materiju preparata **Decis® Expert**, odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata

NAPOMENE:

Kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče.

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, bordovskom čorbom, sumporom, azin-fos-metilom.

KARENCA:

Suncokret - 60 dana;
Pšenica - 35 dana;
Kukuruz - 30 dana;
Uljana repica - 42 dana;
Lucerka – 14 dana;
Višnja i grašak - 7 dana.

PAKOVANJE:

50 ml i 500 ml

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Emulzija ulje u vodi-EW

AKTIVNA MATERIJIA:

Abamektin 18 g/l

PRIMENA:

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje (*Panonychus ulmi*) tretiranjem od fenofaze precvetavanja po pojavi prvih pokretnih formi grinja.

Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja

Utrošak vode: 1000 l/ha

U zasadu kruške se primenjuje za suzbijanje kruškine buve (*Cacopsylla pyri*) tretiranjem od fenofaze precvetavanja u vreme masovnog piljenja larvi.

Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja

Utrošak vode: 1000 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA:

Crvena voćna grinja (*Panonychus ulmi*), obična kruškina buva (*Cacopsylla pyri*)

MEHANIZAM DELOVANJA:

Kontaktni i digestivni insekto-akaricid, sa ograničenim sistemičnim delovanjem.

Alosterični modulatori glutamat - regulisanih kanala za jone hlora (GluCl).

Glutamat je važan inhibitorski neurotransmiter kod insekata, aktiviraju GluCl kanale prouzrokujući paralizu - prestaje ishrana jedinki u roku od nekoliko sati od ingestije, a uginuće nastupa 2-4 dana kasnije.

Nervno - muskulaturni otrovi.

Kategorija rezistentnosti (IRAC) 6

NAPOMENE:

U zasadima kruške optimalno vreme primene je posle cvetanja tokom maja meseca, tada istovremeno suzbija i rđastu grinju kruške. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti obične kruškine buve i crvenog pauka na abamektin, ne primenjivati ga više od dva puta tokom vegetacione sezone.

Ne primenjivati alternativno sa sredstvima iz grupe avermektina.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zbog njegove izuzetne otrovnosti na pčele i druge oprašivače. Ne primenjivati kada spoljna temperatura prelazi 28°C, jer u takvim uslovima efekat preparata može izostati. Najbolje ga je primeniti predveče, pred zalazak sunca, pošto je foto i termolabilan.

Dobro se meša sa većinom pesticida i folijarnim đubrivima, a naročito dobro sinergističko delovanje pokazuje sa mineralnim i biljnim uljima.

Ne meša se sa preparatima na bazi kaptana i sumpora, kao i sa preparatima izrazito

kisele ili izrazito alkalne reakcije. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA:

Jabuka- 14 dana;

Kruška- 14 dana.

PAKOVANJE:

1L i 5L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



MEGATHRIN 2,5 EC

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

lambda-cihalotrin 25 g/l

PRIMENA:

MEGATHRIN 2.5 EC je nesistemični insekticid i akaricid sa kontaktim i digestivnim delovanjem.

Primenjuje se za suzbijanje Žitne pijavice (*Lema melanopus*) u količini od 0,2 l/ha (2 ml/100 m²) pri pojavi larvi III stupnja razvoja u ratarskim kulturama.

Utrošak vode: 200-400 l/h (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta, u razmaku 15-21 dan, u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida i deluje kao modulator natrijumovih kanala. Spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida i ima prvenstveno kontaktno delovanje. Nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).

NAPOMENE:

Zbog razvoja rezistentnosti insekata i ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida koji je registrovan u našoj zemlji.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

KARENCA:

Pšenica - 35 dana.

PAKOVANJE:

50 ml, 100 ml, 200 ml i 1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



MOSPILAN® 20 SG

FORMULACIJA:

Vodorastvorljive granule (SG)

AKTIVNA MATERIJA:

acetamiprid 200 g/kg

PRIMENA:

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje:

- **jabukinog smotavca** (*Cydia pomonella*) u koncentraciji **0,025%** (2,5 g u 10 l vode) na početku piljenja prvih gusenica;
- za suzbijanje **minera** (*Lyonetiidae*) u koncentraciji **0,0125-0,025%** (1,25-2,5 g u 10 l vode) u vreme leta leptira i formiranja prvih mina;
- **lisnih vaši** (*Aphis* spp) u zasadu jabuke u koncentraciji **0,02-0,025%** (2-2,5 g u 10 l vode) na početku formiranja prvih kolonija;

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje:

- **krompirove zlatice** (*Leptinotarsa decemlineata*), u količini **0,2-0,25 kg/ha** (2,0-2,5 g na 100 m²), tretiranjem pri pojavi prvih larvi četvrtog stupnja;

U usevu paradajza se primenjuje za suzbijanje:

- **bele leptiraste vaši** (*Trialeurodes vaporariorum*), tretiranjem u vreme pojave larvi, u količini **0,25 kg/ha** (2,5 g na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku sezone.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Mospilan 20 SG je insekticid iz hemijske grupe neonikotinoida. Aktivna materija ovog insekticida, acetamiprid, deluje kao antagonist acetilholinskih receptora u centralnom nervnom sistemu (CNS) insekata, odnosno sprečava njihovu funkciju. Ovakvo delovanje ima za

posledicu neprenošenje nervnih impulsa, što dovodi do gubitka orijentacije kod insekata, njihovog prestanka sa ishranom i do uginjavanja.

NAPOMENE:

Mospilan 20 SG ima izuzetno inicijalno i rezidualno delovanje.

Na primenu ovog insekticida ne utiče visoka temperatura vazduha.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima osim onih alkalne reakcije kao što je bordovska čorba.

KARENCA:

Krompir i paradajz – 14 dana;

Jabuka - 28 dana.

PAKOVANJE:

2,5g, 250g i 1kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

Mospilan® 20 SG

Назив, формула: Иноцитрид, водорастворљиве грануле (SG) прве класе брзе

Генерички назив, хемијски састав: Ацетамиприд 200 г/кг (20%)

Назив препарата: Системски инсектицид са контактни и дисперзивним деловима који се користи у условима кромпира и парадајза и засаду јабуче за сузбијање штетних инсеката.

Модел: Прва употреба: средство за заштиту билије обавезно прочитати етикету. Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици за здравље људи и животну средину.

Опасна и еколошка опасност

GHS 07 GHS 09

Пазња

Обавештење о опасности: H 302: Штетно ако се прогута. H 410: Веома токсично пољски свету води са дуготрајним последицама

Обавештење о мерама предосторожности: P 264: Опрати руке и лице детаљно након сувовања. P 270: Не јести, не пити и не пушити прецином ручалача или производа. P 501: ИСО 15115: АВО СЕПРОФИТА Пољски ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ПРОДУКЦИЈА / Лабелу укључно са не самога дробо. P 330: Испрати уста. P 391: Сакупити проливи одрај. P 501: Сакупити падавину / лебавити у складу са националним и интернационалним прописима

Додатно обавештење о опасности: EUH 401: Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици за здравље људи и животну средину.

Напомена: Органи и брзи докази: Референтни број: 1014-1000001011-11 од 01.01.2020. са свим важећим изменама и допунама

Рок употребе: 2 године од датума производње

Произвођач: Nisso

ИМПОН СОДА Со. Лтд., Јапан
Број Контакт Центра: 011-201-2500

Заступник и дистрибутер: DELTA AGRAR
Аутопут за Београд 36,
11070 Нови Београд,
тел: 011-201-2500

RADIANT™ 120 SC

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

spinetoram 120 g/l

PRIMENA:

Preparat RADIANT™ 120 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) u usevu kukuruza, u količini 0,4 l/ha, tretiranjem u vreme polaganja jaja i početka piljenja larvi.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine, u razmaku od 10 dana.

MEHANIZAM DELOVANJA:

RADIANT™ 120 SC Ima dvojno delovanje – kontaktno i digestivno deluje na sve razvojne faze stetočina, a posebno se ističe izuzetno brza larvicidna aktivnost. Po mehanizmu delovanja modulator acetil holin receptora, Svrstan je u IRAC grupu 5 i odlično se uklapa u program antirezistentne strategije. Nije zabeležena ukrštena rezistentnost sa drugim insekticidima iz grupe spinozina.

DODATNI BENEFITI:

Visoka efikasnost suzbijanja kukuruznog plamenca;

Izrazito brzo početno ali i dugotrajno delovanje;

Male doze primene uz minimalan uticaj na životnu sredinu;

Jedinstven mehanizam delovanja bez pojave ukrštene rezistentnosti;

Povoljan ekotoksikološki profil sa minimalnim uticajem na korisne organizme;

Idealno rešenje za integralnu zaštitu bilja.

KARENCA:

14 dana.

PAKOVANJE:

500ml

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

Radiant™

Jemvelva™ active

INSEKTICID

SOILGUARD 1,5 GR

FORMULACIJA:

Granule (GR)

AKTIVNA MATERIJAI:

teflutrin 15 g/kg

PRIMENA:

Soilguard 1,5 gr je nesistemični zemljišni insekticid sa kontaktnim i inhalacionim delovanjem primenjuje u usevu kukuruza za suzbijanje larvi žičnjaka (*Agriotes* sp.) i kukuruzne zlatice (*Diabrotica virgifera*) u količini 7-10 kg/ha (70-100 g/100 m²) tretiranjem istovremeno sa setvom (00 BBCH-skale).

Primenjuje se direktno na zemljište prilikom setve deponovanjem u brazdu (inkorporacijom) oko semena pomoću posebnih uređaja (depozitora) za primenu i doziranje granuliranih insekticida na sejalicama. Ne meša se sa vodom.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom, u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Soilguard 1,5 gr je insekticidi iz grupe piretroida. Deluje na nervni sistem insekta jer remeti protok Na⁺ jona kroz nervne membrane. Insekticidi iz ove grupe na bazi indoksakarba prema IRAC listi svrstani su u 3A grupu rezistentnosti.

NAPOMENE:

Ima produženo delovanje i do 90 dana posle deponovanja, a ispuštanje pare omogućavaju bolju difuziju proizvoda u zemljištu. Nije dozvoljeno rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je na primer razbacivanje gran-

ula po površini zemljišta rasipačima za mineralno đubrivo.

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Upotrebljava se samostalno. Pre ili posle primene ovog insekticida mogu se primenjivati sva registrovana zemljišna i folijarna sredstva za zaštitu bilja.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

20 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



AKARICIDI

DELTA AGRAR
www.deltaagrar.rs

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

heksitiazoks 100 g/l

PRIMENA:

Nissorun® 10 EC se koristi za suzbijanje crvene voćne grinje (*Panonychus ulmi*) u zasadima jabuke, breskve i vinove loze u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml / 10 l vode), tretiranjem zimskih jaja do početka piljenja ili letnjih jaja do momenta kada se na jednom listu nalazi najviše 2-3 pokretna stadijuma.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom toku jedne godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija preparata **Nissorun® 10 EC** pripada hemijskoj grupi karboksamida i deluje inhibitory na razvoj grinja. Ovo je nesistemični akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. **Nissorun® 10 EC** uspešno suzbija jaja, larve i nimfe štetnih grinja sa obe strane lista zahvaljujući svom izrazitom translaminarnom kretanju. Ne ispoljava delovanje na odrasle grinje.

NAPOMENE:

Nissorun® 10 EC praktično nije toksičan za ptice i pčele.

Ne primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (flufenzin, klofentenzin), zbog ukrštene rezistentnosti.

Nissorun® 10 EC se ne meša sa preparatima WP formulacija.

KARENCA:

Jabuka, breskva i vinovu loza – 35 dana.

PAKOVANJE:

50 ml i 1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

NISSORUN® 10 EC

Назив: Формулација: Активна супстанца за емулзију (EC)
 Температурни опсег: амбиентна температура
 Концентрација: 100 ± 10 g/l
 CAS: 78552-93-2

Намена примене: Акарицид за сузбијање црвене воћне гринје у засадима јабуче, брескве и винове лоазе.
Издање: Пре употребе средстава за заштиту биља обавезно прочитајте етикету. Придржавати се упутстава за употребу да би се избегло ризици за здравље људи и животну средину.
Опасна и амбиентна опасност:

GHS 02
GHS 07
GHS 05
GHS 08
GHS 09

Опасност
Обавештење о опасностима: H226. Запаљива течност или паре. H332. Штетно ако се удише. H315. Изазива иритацију коже. H317. Дозвољено је носити контактне линзе. H373. Може да изазове озбиљна оштеćenja на очима. H351. Сложно је да може да доведе до озбиљне репродуктивне штете. H360D. Може изазвати да утиче на плодност или на плод. H373D. Може да изазове озбиљну репродуктивnu штету. H410. Може изазвати озбиљну штету на водојачу и биљном животу. H411. Штетност може бити озбиљна за водозачувачке врste.

Обавештење о мерама предосторожности: P201. Држите одаво од деце. P202. Чувати ван домета деце. P273. Избегавајте испуштање у животну средину и друге изворе воде. P301+P312. У случају неугодности: испуштање у воду. P302+P352. У случају контакта са очима: испуштање у воду. P303+P361+P353. У случају контакта са одећом: испуштање у воду. P305+P351+P338. У случају контакта са очима: испуштање у воду. P308+P313. У случају контакта са очима: испуштање у воду. P312. Испуштање у воду. P314. Испуштање у воду. P315. Испуштање у воду. P316. Испуштање у воду. P317. Испуштање у воду. P318. Испуштање у воду. P319. Испуштање у воду. P320. Испуштање у воду. P321. Испуштање у воду. P322. Испуштање у воду. P323. Испуштање у воду. P324. Испуштање у воду. P325. Испуштање у воду. P326. Испуштање у воду. P327. Испуштање у воду. P328. Испуштање у воду. P329. Испуштање у воду. P330. Испуштање у воду. P331. Испуштање у воду. P332. Испуштање у воду. P333. Испуштање у воду. P334. Испуштање у воду. P335. Испуштање у воду. P336. Испуштање у воду. P337. Испуштање у воду. P338. Испуштање у воду. P339. Испуштање у воду. P340. Испуштање у воду. P341. Испуштање у воду. P342. Испуштање у воду. P343. Испуштање у воду. P344. Испуштање у воду. P345. Испуштање у воду. P346. Испуштање у воду. P347. Испуштање у воду. P348. Испуштање у воду. P349. Испуштање у воду. P350. Испуштање у воду. P351. Испуштање у воду. P352. Испуштање у воду. P353. Испуштање у воду. P354. Испуштање у воду. P355. Испуштање у воду. P356. Испуштање у воду. P357. Испуштање у воду. P358. Испуштање у воду. P359. Испуштање у воду. P360. Испуштање у воду. P361. Испуштање у воду. P362. Испуштање у воду. P363. Испуштање у воду. P364. Испуштање у воду. P365. Испуштање у воду. P366. Испуштање у воду. P367. Испуштање у воду. P368. Испуштање у воду. P369. Испуштање у воду. P370. Испуштање у воду. P371. Испуштање у воду. P372. Испуштање у воду. P373. Испуштање у воду. P374. Испуштање у воду. P375. Испуштање у воду. P376. Испуштање у воду. P377. Испуштање у воду. P378. Испуштање у воду. P379. Испуштање у воду. P380. Испуштање у воду. P381. Испуштање у воду. P382. Испуштање у воду. P383. Испуштање у воду. P384. Испуштање у воду. P385. Испуштање у воду. P386. Испуштање у воду. P387. Испуштање у воду. P388. Испуштање у воду. P389. Испуштање у воду. P390. Испуштање у воду. P391. Испуштање у воду. P392. Испуштање у воду. P393. Испуштање у воду. P394. Испуштање у воду. P395. Испуштање у воду. P396. Испуштање у воду. P397. Испуштање у воду. P398. Испуштање у воду. P399. Испуштање у воду.

Додатна обавештења о опасностима: EUH051. Држите ван домета деце и животиња. EUH052. Држите ван домета деце и животиња. EUH053. Држите ван домета деце и животиња. EUH054. Држите ван домета деце и животиња. EUH055. Држите ван домета деце и животиња. EUH056. Држите ван домета деце и животиња. EUH057. Држите ван домета деце и животиња. EUH058. Држите ван домета деце и животиња. EUH059. Држите ван домета деце и животиња. EUH060. Држите ван домета деце и животиња. EUH061. Држите ван домета деце и животиња. EUH062. Држите ван домета деце и животиња. EUH063. Држите ван домета деце и животиња. EUH064. Држите ван домета деце и животиња. EUH065. Држите ван домета деце и животиња. EUH066. Држите ван домета деце и животиња. EUH067. Држите ван домета деце и животиња. EUH068. Држите ван домета деце и животиња. EUH069. Држите ван домета деце и животиња. EUH070. Држите ван домета деце и животиња. EUH071. Држите ван домета деце и животиња. EUH072. Држите ван домета деце и животиња. EUH073. Држите ван домета деце и животиња. EUH074. Држите ван домета деце и животиња. EUH075. Држите ван домета деце и животиња. EUH076. Држите ван домета деце и животиња. EUH077. Држите ван домета деце и животиња. EUH078. Држите ван домета деце и животиња. EUH079. Држите ван домета деце и животиња. EUH080. Држите ван домета деце и животиња.

Број издања: 3114305001-14 2004-11 0109140104, издање: сваки нови издање и измене и допуна.

Регулатор: 3 године од датума произвођача.

Произвођач:

DELTA

МРКОВИЋИ, 18. Маја, 3000

3114305001-14 2004-11 0109140104, издање

Заступник и дистрибутер:

DELTA

AGRAR

Копачки пут бр. 45

11170 Нови Београд, Београд 11000

REGULATORI RASTA

DELTA AGRAR
www.deltaagrار.rs

CYCOCEL® 750

FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

hlormekvat-hlorid 750 g/l

PRIMENA:

Cycocel® 750 je regulator rasta biljaka, koristi se u usevu pšenice.

Količina primene:

1,0 - 2,0 l/ha

Vreme primene:

Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (BBCH 21-32).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:

Smanjenje visine stabla i povećanje otpornosti useva na poleganje.

NAPOMENA:

Može da se meša sa herbicidima i fungicidima koji se koriste u prvom tretmanu. Ne treba ga koristiti zajedno sa sredstvima koja u sebi sadrže stimulatore rasta (auksine, gibereline) jer oni podstiču izduživanje i tada će, inače vrlo povoljan efekat, izostati.

KARENCA:

63 dana.

PAKOVANJE:

10 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



FORMULACIJA:

Vodorastvorljive granule (SG)

AKTIVNA MATERIJA:

metamitron 150 g/kg

PRIMENA:

Brevis® se primenjuje za proređivanje plodova jabuke, omogućava veći procenat plodova prve klase i bolji i sigurniji plasman proizvoda.

Prilikom primene posebno obratite pažnju na sledeće:

U prvom tretmanu (veličina središnjeg plodića 8mm) voditi računa da se ravnomerno tretira celo stablo;

U drugom tretmanu (središnji plodić 12mm) mogu se raditi usmereni tretmani (tretirati samo krunu stabla);

Utrošak vode: 300-400 l/ha na svaki metar visine stabla, odnosno maksimalno 1000 l/ha;

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u jednokratnom ili dvokratnom tretmanu u toku godine.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Brevis® deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze (fotosistem II), koji se kod jabuke manifestuje odbacivanjem manje razvijenih plodića. Prvi vidljivi efekti delovanja (promena boje peteljke, zaostajanje u razvoju plodića koji će kasnije otpasti) se mogu uočiti 12-14 dana nakon primene.

NAPOMENE:

- ako su dnevne temperature preko 25°C raditi predveče;
- ne tretirati po vetru, posebno voditi računa da ne dolazi do zanošenja na koštičavo voće, pošto su moguća jaka oštećenja;
- ako imate protivgradne mreže računajte da će efekat proređivanja sa istom dozom biti jači nego u zasadu bez mreže;
- efekat proređivanja će biti jači u uslovima snažnijeg porasta i kada je sunčeva radijacija slabija.

KARENCA:

Određena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

trineksapak-etil 175 g/l

PRIMENA:

Trimaxx® je regulator rasta biljaka za povećanje otpornosti na poleganje.

Primenjuje se u usevu pšenice u dozi 0,4 do 0,6 l/ha (4-6 ml na 100 m²) od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/m²)

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku godine.

NAPOMENE:

Trimaxx® je fleksibilan u primeni, ali je rana primena (faza 30-32 BBCH skale) uvek efikasnija. Čvrstina i debljina prve dve internodije od najveće je važnosti za otpornost na poleganje. U kasnijoj primeni efekat delovanja je slabiji jer se skraćuju srednja i gornja internodija. Gornja doza primene i rana primena (faza 30-32 BBCH skale) se preporučuje kod povećanog rizika od poleganja, osetljivog sortimenta žita, ranije setve, previše bujnog useva ili velike količine padavina.

Neki fungicidi na bazi aktivnih materija iz hemijske grupe triazola, pojačavaju delovanje regulatorima rasta. Pri mešanju sa njima može se ići sa nižom dozom **Trimaxx®**-a (smanjiti dozu za 0,05-0,1 l/ha u odnosu na preporučenu).

DODATNI BENEFITI:

Posebno birani dodaci, snažni ađuvanti u inovativnoj formulaciji **Trimaxx®**-a imaju različite funkcije:

- Doprinosе brzu penetraciju (apsorpciju) aktivne supstance kroz kutikulu tretiranog lišća i odličnu distribuciju preparata **Trimaxx®** u biljci;
- Maxx tehnologija doprinosi efikasnijoj upotrebi i mnogo boljoj iskorišćenosti aktivne supstance trineksapak-etil od strane biljke u odnosu na standardne formulacije.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



OKVAŠIVAČI

DELTA AGRAR
www.deltaagrار.rs

FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

PRIMENA:

Magis je okvašivač i poboljšava kvašenje lisne površine biljaka i doprinosi boljoj distribuciji pesticida na tretiranoj površini. Koristi se kao pomoćno sredstvo – okvašivač, **koji poboljšava prijanjanje preparata za list gajene biljke ili korova**. Samim tim se sprečava slivanje pesticida sa biljke, a ubrzava se delovanje i lakše prodiranje preparata u biljku.

Primenjuje se u količini **0,25 l/ha** (2,5 ml/100 m²) uz upotrebu vode od 200-400 l/ha u isto vreme kada i pesticid kome se dodaje.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom ili dva puta u podeljenoj količini primene.

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Meša se sa svim sulfonilurea herbicidima.

Ne meša se sa jakim bazama, jakim kiselinama, jakim oksidativnim agensima.

Plodored:

Od pesticida sa kojima se okvašivač **MAGIS** meša zavisi koji se usevi mogu sejati u normalnom plodoredu.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

metil estri masnih kiselina (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat) 348,8 g/l + fosfatni estar polioksialkilovanih alkohola 209,3 g/l + oleinska kiselina 46,5 g/l

PRIMENA:

Dash® se kao pomoćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Okvašivač **Dash®** se koristi u kombinaciji sa herbicidom **Corum®**, jer se na taj način značajno poboljšavaju performanse herbicida, kada se primeni sa pomenutim okvašivačem.

Posebno je primetan efekat primene **Dash®**-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima, kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Okvašivač **Dash®** se primenjuje u količini od 0,5-1 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

NAPOMENA:

Dash® je gratis u paketu sa prepartom **Corum®**.

KARENCA:

Ne odnosi se na okvašivač.

PAKOVANJE:

1L i 5L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

karboksilirani stiren 1,3 butadien 456 g/l +
alkoholni alkoksilat 71 g/l

PRIMENA:

ELASTIQ® ULTRA se primenjuje se kao pomoćno sredstvo za sprečavanje osipanja semena ozime uljane repice, graška, soje i suncokreta kao i za smanjivanje zanošenja sredstava za zaštitu bilja (fungicida, insekticida, akaricida i herbicida).

Vreme, način i količine primene:

U ozimoj uljanoj repici:

- Samim sredstvom tretira se 3-4 nedelje pre očekivane žetve za vreme kada požute mahune, kada je plod već 30% zreo;
- U kombinaciji sa desikantima tretira se 7-14 dana pre očekivane žetve, kada je vlažnost zrna od 20-30%;
- Fenostadijum poslednjeg tretiranja je 7 dana pre očekivane žetve (faza 80-83 BBCH skale, žute mahune).

U ozimoj uljanoj repici se primenjuje folijarno, u količini od 0,5-1 l/ha samostalno ili u kombinaciji sa desikantima, uz utrošak vode 300-500 l/ha.

U suncokretu:

- Samim sredstvom tretira se 3-4 nedelje pre očekivane žetve pri vlažnosti zrna u glavici suncokreta od 35 do 40%;

- U kombinaciji sa desikantima tretira se 7-14 dana pre očekivane žetve, kada je vlažnost zrna od 25-30%;
- Fenostadijum poslednjeg tretiranja je 7 dana pre očekivane žetve (faza 85 BBCH skale, meka voštana zrelost).

U suncokretu se primenjuje folijarno, u količini od 1-1,5 l/ha samostalno ili 1l/ha u kombinaciji sa desikantima, uz utrošak vode 400-500 l/ha.

U soji i grašku:

- Samim sredstvom tretira se 3-4 nedelje pre očekivane žetve kod vlažnosti zrna od 30 do 35%;
- U kombinaciji sa desikantima tretira se 7-14 dana pre očekivane žetve, kada je vlažnost zrna od 20-30%;
- Fenostadijum poslednjeg tretiranja je 7 dana pre očekivane žetve (faza 85 BBCH skale, sazrevanje).

U soji i grašku se primenjuje folijarno, u količini od 0,5-1 l/ha samostalno ili 0,5-0,8 l/ha u kombinaciji sa desikantima, uz utrošak vode 300-500 l/ha.

Za sprečavanje zanošenja sredstava za zaštitu bilja koristi se u količini od 0,35-0,5 l/ha, a vreme i način primene zavise od sredstva sa kojim se koristi.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku vegetacije.

NAPOMENE:

Može se mešati sa drugim pesticidima, preporučuje se mešanje sa sredstvima za desikaciju.

BENEFITI PRIMENE:

- Redukuje lomljenje ljuske;
- Smanjuje gubitke koji nastaju pre žetve koji su uzrokovani meteorološkim uslovima (oluja, grad, vetar);
- Povećava prinos i kvalitet semena;
- Pogodan za primenu sam, ali se može kombinovati i sa desikantima.

KARENCA:

Ako se koristi prema propisima nema ograničenja.

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



SPECIJALNI PROGRAM

DELTA AGRAR
www.deltaagrar.rs

BIOSTIMULATORI

Biostimulatori su bilo koje supstance ili mikroorganizmi ili bilo koja kombinacija takve supstance i/ili mikroorganizma koje primenjeni na biljkama, semenima ili okolini korena stimulišu prirodne procese u biljkama, poboljšavaju efikasnost i iskorišćavanje hraniva ili povećavaju tolerantnost na abiotički stres, bez obzira na svoj nutritivni sastav.

Biostimulatori su materije koje nisu đubriva, ali koje stimulišu rast biljaka kada se primene u niskim količinama. Oni su dostupni u velikom broju formulacija čije se aktivne materije mogu klasifikovati kao: huminske supstance, proizvodi koji sadrže hormone i aminokiseline. Produkti koji sadrže hormone, kao što su morske trave sadrže auksine, citokinine i njihove derivite koji su zaduženi za rast.

Upotreba morske trave kao izvor organske materije je drevna u poljoprivredi. Morske alge deluju na zemljište, kao i na biljke. One se mogu primeniti preko zemljišta, u hidroponskom rastvoru ili folijarno. U zemljištu, polisaharidi algi doprinose formiranju gela, zadržavanju vode i aeraciji zemljišta. Komponente morskih algi, osim hormona auksina, citokinina, giberelina su i polisaharidi laminarin, alginati, kao i produkti njihovog razlaganja. Međutim, takođe je otkriveno da alge, osim što svojim hormonskim produktima deluju povoljno na rast biljke, dovode do stimulacije biosinteze hormona rasta kod biljaka.

ExelGrow® je sredstvo za ishranu biljaka koje pospešuje rast i razvoj povrtarskih useva.

SASTAV PROIZVODA:

Fermentisan ekstrakt morske alge *Aschophyllum nodosum* + organski ugljenik (C) 9.6 % + kalijum (K₂O) 3.5 %

PRIMENA:

Usev	Vreme primene	Količina primene
Krompir i drugo krtolasto povrće	Primenjuje se u fazi formiranja krtole	1 l/ha
Lukovičasto, lisnato i korenasto povrće, kao i kupusnjače	Prvi tretman je po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od 21 dan	1 l/ha
Mahunasto povrće	Primenjuje se od početka cvetanja, pa tokom cvetanja	1 l/ha
Krastavac, dinja, lubenica, bundeva, paradajz i paprika	Prvi tretman je po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od po 21 dan	1 l/ha

Primenjuje se folijarno i fertirigacijom uz utrošak vode od 600 l/ha (6l/m²).

BENEFITI PRIMENE:

- **ExelGrow®** utiče na bolju efikasnost usvajanja azota od strane biljke;
- Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema, te se primena ovog đubriva preporučuje kada biljka raste ili se razvijaju novi organi npr. kao što je rast korena nakon presađivanja;
- Sadrži kalijum koji se pokazao odličnim kada se primenjuje u fazi formiranja cveta i zametanja plodova;
- **ExelGrow®** u svom sastavu ima i glicin betaine i salicilne kiseline koje štite biljke od oštećenja izazvanih abiotskim stresom. U tom smislu preporučuje se primena u proleće, pre ostvarivanja uslova za izmrzavanje, zatim pred leto kada su biljke u fazi intenzivne potrošnje vode ili u terminima primene herbicida;
- Ukoliko se đubrivo primeni u danima pred berbu dokazano je da utiče na povećanje kvaliteta plodova.

NAPOMENA:

ExelGrow® je kompatibilan sa većinom uobičajenih pesticida na tržištu, ne ometajući njihovu aktivnost ili selektivnost. Pre upotrebe u kombinaciji sa sumpornim proizvodima preporučuje se testiranje na manjim površinama.

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!



BIOSTIMULATOR ZA POBOLJŠANU ISHRANU BILJAKA KALCIJUMOM

Folical aktivira ishranu biljaka i obezbeđuje njihovu snabdevenost kalcijumom. Njegova formula je u potpunosti selektivna i sprečava fiziološki disbalans kod voća, povrća (nastanak gorkih pega, mikrofisure epidermisa), čime se povećava kvalitet i dužina skladištenja plodova.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (filtrat morske alge *Ascophyllum nodosum*) + CaO 15%

PRIMENA:

Usev	Vreme primene	Količina primene	Broj tretiranja	Način primene
Voće	Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe	3 - 5 l/ha	2 - 3	Folijarno
Povrće	Nakon formiranja plodova do 20 dana pre berbe	3 - 5 l/ha	2 - 3	Folijarno

NAČIN DELOVANJA:

GA 142 (filtrat morske alge *Ascophyllum nodosum*) u biljkama dovodi do pojačane aktivacije svih biljnih fizioloških procesa, poboljšano usvajanje, transport i iskorišćavanje hranljivih materija u biljkama, intenzivnije fotosinteze i povećanja otpornosti biljaka na stresne uslove.

BENEFITI PRIMENE:

- Bolje usvajanje, brži transport i iskorišćavanje kalcijuma u biljkama (plodovima);
- Kontinuirani rast plodova bolje čvrstine i kvaliteta;
- Veći procenat plodova prve klase;
- Bolja ujednačenost i obojenost plodova;
- Veća koncentracija šećera;
- Veća otpornost plodova na trulež i pojavu gorkih pega;
- Bolje čuvanje i skladištenje plodova.

NAPOMENA:

Folical se može mešati sa svim sredstvima za zaštitu bilja.

PAKOVANJE:

5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**



BIOSTIMULATOR ZA INTENZIVNIJU FOTOSINTEZU I DUŽE NALIVANJE ZRNA

Forthial se koristi za folijarno đubrenje žitarica na različitim tipovima zemljišta.

Povećava intenzitet fotosinteze, deluje na veći sadržaj hlorofila u listovima i duže nalivanje zrna u žitaricama.

Ubrzavaju se svi fiziološki procesi, biljke bolje iskorišćavaju đubriva i otpornije su na stresne uslove.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (filtrat morske alge *Ascophyllum nodosum*) + N (NO₃) 6,2% + MgO 9%

PRIMENA:

Usev	Vreme primene	Količina primene	Broj tretiranja	Način primene
Žitarice	Pojava lista zastavičara do početka cvetanja	1 l/ha	1	Folijarno

NAČIN DELOVANJA:

Forthial deluje na bolje usvajanje i bolje iskorišćavanje hraniva iz zemljišta u samim biljkama.

Stimuliše sintezu poliamina i povećava intenzitet fotosinteze.

Osigurava se dodatni izvor azota i magnezijuma koji su osnovni elementi hlorofila. Forthial dovodi do većeg sadržaja hlorofila, pre svega u gornjim listovima koji igraju ključnu ulogu u stvaranju prinosa. Duže je nalivanje, zrna su krupnija i teža a samim tim ima direktan uticaj na veći prinos biljaka.

KORISTI ZA BILJKU:

- Intenzivnija fotosinteza, veći sadržaj hlorofila u listovima;
- Efikasnija funkcija lista zastavičara – duže nalivanje zrna;
- Pojačano usvajanje, transport i iskorišćavanje hraniva u biljkama;
- Više zrna u klasu, teža i krupnija zrna.

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:

- Bolja iskorišćenost đubriva;
- Povećanje prinosa;
- Bolji kvalitet zrna;
- Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja.

PAKOVANJE:

5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo**



BIOSTIMULATOR ZA POBOLJŠANU ISHRANU BILJAKA BOROM

Multoleo se koristi za folijarno đubrenje uljarica (uljana repica, suncokret, soja) i šećerne repe na različitim tipovima zemljišta.

Pospešuje oplodnju, ima direktan uticaj na veći prinos. Ubrzavaju se svi fiziološki procesi, biljke bolje iskorišćavaju đubriva i otpornije su na stresne uslove.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (*Ascophyllum nodosum* filtrat) + B (9,9 %)

PRIMENA:

Usev	Vreme primene	Količina primene	Broj tretiranja	Način primene
Soja	Pre cvetanja ili početak cvetanja	2 l/ha	1	Folijarno
Suncokret	Kod pojave generativnih organa (zadnji momenat ulaska u polje)	2 l/ha	1	Folijarno
Uljana repica	Pre cvetanja ili početak cvetanja	2 l/ha	1	Folijarno
Šećerna repa	Početak zatvaranja redova do prvog fungicidnog tretmana protiv <i>Cercospora beticola</i>	3 - 4 l/ha	1 - 2	Folijarno

MEHANIZAM DELOVANJA:

Multoleo dovodi do aktivacije novih načina u ishrani biljke. Pospešuje efekat đubrenja jer dovodi do boljeg iskorišćavanja hraniva od strane biljke. Dovodi do aktivacije sinteze endogenih poliamina u generativnim delovima biljaka, pospešuje oplodnju, intenzivira fotosintezu i samim tim ima direktan uticaj na prinos biljaka.

KORISTI ZA BILJKU:

- Bolje usvajanje i iskorišćenje bora u biljkama;
- Bolja ishrana biljke u najvažnijim stadijumima razvoja;
- Bolja cvetanje i oplodnja (posebno u stresnim uslovima);
- Bolje formiranje i manje opadanje mahuna (uljarice), manje odbacivanje listova (šećerna repa)

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:

- Bolja iskorišćenost đubriva;
- Povećanje prinosa;
- Veći sadržaj šećera – šećerna repa;
- Veći sadržaj ulja – uljarice;
- Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo



BIOSTIMULATOR ZA BOLJE UKORENJAVANJE BILJAKA

Rooter se koristi za folijarno đubrenje uljane repice i žitarica na različitim tipovima zemljišta.

Stimuliše rast korena i deluje na bolje ukorenjavanje biljaka. Tretmanom u jesen omogućava bolje prezimljavanje biljaka, a u proleće brži oporavak i početni porast nakon prezimljavanja.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™

GA 142 (filtrat morske alge *Ascophyllum nodosum*) + P₂O₅ 13% + K₂O 5%

MEHANIZAM DELOVANJA:

Rooter deluje na bolje usvajanje i bolje iskorišćavanje hraniva iz zemljišta u samim biljkama. Stimuliše sintezu poliamina i povećava intenzitet fotosinteze, a najznačajniji efekt je bolji razvoj korenovog sistema.

Rooter obezbeđuje bolje prezimljavanje biljaka, i bolje bokorenje primenom u jesen. Primenom u proleće omogućava bolji oporavak i brži početni porast nakon prezimljavanja. Deluje na smanjenje internodija, zadebljanje i stabilnost stabljike, bolji protok hraniva kroz biljku, a samim tim ima direktan uticaj na veći prinos biljaka.

KORISTI ZA BILJKU:

- Bolji rast i razvoj korenovog sistema;
- Pojačano usvajanje, transport i iskorišćavanje hraniva u biljkama;
- Bolje prezimljavanje, bolji oporavak i početni porast u proleće;
- Bolje bokorenje, deblja i čvršća stabljika;
- Veći broj klasova/mahunama, i veći broj zrna u klasovima/mahunama

KORISTI ZA PROIZVOĐAČA:

- Bolja iskorišćenost đubriva iz zemljišta;
- Omogućava efikasniju borbu biljaka protiv nepovoljnih vremenskih uslova;
- Povećanje prinosa i kvaliteta;
- Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja

PAKOVANJE:

5 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

PRIMENA:

Usev	Vreme primene	Broj tretiranja	Vreme i način primene
Rasad povrća	0,1 - 0,2 % rastvor	1	Zalivanje sistemom za navodnavanje, od pojave prvog pravog lista i zatim 7 - 10 dana kasnije
Povrće na otvorenom i zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici)	0,1 - 0,2 % rastvor ili 2 - 5 l/ha	2 - 8	Zalivanje sistemom za navodnavanje, nakon sadnje i zatim svakih 10 - 15 dana
Voće	0,1 - 0,2 % rastvor ili 3 - 5 l/ha	1	Sistemom za navodnjavanje, na početku vegetacije i kod formiranja plodova
Vinova loza	0,1 - 0,3 % rastvor ili 3 - 5 l/ha (zavisno od tipa zemljišta)	1 - 2	Sistemom za navodnjavanje, na početku vegetacije i kod formiranja grozdova
Cveće i ostalo ukrasno bilje	0,1 - 0,2 % rastvor	2 - 3	Zalivanje sistemom za navodnavanje, tokom proizvodnje, u početnim fazama razvoja
Žitarice	1 l/ha	1	Folijarno, 2 - 3 lista u jesen ili nakon zime
Uljana repa	1 l/ha	1	Folijarno, 4 - 6 listova u jesen ili nakon zime
Kukuruz	1 l/ha	1	Folijarno, 4 - 8 listova
Soja	1 l/ha	1	Folijarno, 2 - 3 troliska
Suncokret	1 l/ha	1	Folijarno, 4 - 6 listova
Šećerna repa	1 - 2 l/ha	1	Folijarno, 4 - 8 listova
Krompir	1 - 2 l/ha	1	Folijarno, 10 - 20 cm biljke
Duvan	1 l/ha	1 - 2	Folijarno, nakon sadnje na polju i zatim 10 - 14 dana kasnije

BM START je neorgansko đubrivo sa mikroelementima, koristi se za ishranu različitih biljnih vrsta, a posebno voćarskih i povrtarskih kultura (izuzev lisnatog povrća). Adekvatan je za primenu na svim tipovima zemljišta/supstrata, kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru. Upotrebom ovog đubriva na zemljištima sa deficitom bora moguće je ostvariti vrhunske rezultate.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™.

Bor (B) – 2,0%, molibden (Mo) 0,02%, magnezijum (Mg) 2,1%, sumpor (S) 2,8%

PRIMENA:

BM START je aktivator fiziologije biljaka. Obezbeđuje optimalno formiranje plodova i osigurava bolji raspored plodova na stablu. Ubrzava rast i obezbeđuje ujednačenu berbu kod povrća.

Primenjuje se folijarno, 1-3 puta tokom kasnog vegetativnog rasta, ranog razvoja cvasti ili tokom razvoja krtola, dok se ne postigne potreban nivo mikroelemenata u biljnim tkivima, posebno bora ili do uklanjanja simptoma deficita mikroelemenata, kao i jednokratno neposredno pre ili neposredno nakon delovanja stresnih uslova, posebno stresa izazvanog niskim i visokim temperaturama (suša).

NAPOMENE:

Prilikom primene zajedno sa pesticidima, **BM START** se poslednji sipa u rezervoar.

BM START je kompatibilan sa većinom uobičajenih fungicida i insekticida, ali se ne preporučuje mešanje sa herbicidima. Za informacije o kompatibilnosti herbicida pogledajte uputstva proizvođača. Ne koristite sa proizvodima koji sadrže kalcijum.

PAKOVANJE:

1L i 5L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!**

Usev / zasad	Doza	Vreme primene
Jabuka i kruška	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Faza roze pupoljka Faza punog cvetanja Kraj cvetanja
Stono voće (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva)	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Početak cvetanja Puno cvetanje - Početak opadanja laticnih listića Posle cvetanja
Paradajz, plavi patlidžan, paprika	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Početak cvetanja 10 -15 dana kasnije 10 - 15 dana kasnije
Šargarepa	2 L/ha 2 L/ha	5 - 6 listova 15 dana posle prvog tretmana
Krompir	2 L/ha 2 L/ha	Pojava krtola 2 nedelje posle prvog tretmana
Jagoda	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Pojava prvih cvetnih pupoljaka 2 nedelje posle prvog tretmana 2 nedelje posle drugog tretmana
Sitno voće	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Pre cvetanja U punom cvetanju Formiranje plodova
Crni luk	2 L/ha 2 L/ha	4 lista 2 nedelje posle prvog tretmana
Krastavac, tikvica, dinja, lubenica	2 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Pojava prvih cvetova 10 -15 dana kasnije 10 - 15 dana kasnije

ZEAL je neorgansko tečno đubrivo sa 2 i više mikroelemenata koje se koristi za ishranu kukuruza na različitim tipovima zemljišta, u slučaju deficita cinka, što je naročito izraženo na karbonatnim zemljištima i / ili zemljištima neutralne ili alkalne reakcije.

SASTAV PROIZVODA:

Baziran na Physio Activator Technology™.

Vodeni rastvor morske alge *Ascophyllum nodosum* + vodorastvorljivi molibden (Mo) 0,02 % i cink (Zn) 1,98 %

PRIMENA:

ZEAL se primenjuje folijarno, rastvorima koncentracije 0,2 - 0,3 %, u količini od 2 l/ha po jednom tretmanu. Primenjuje se u prvom delu vegetacije kada su biljke kukuruza u fazi intenzivnog porasta. Prva primena se obavlja kada je kukuruz u fazi 4 – 8 listova.

Broj tretiranja u toku godine: Više puta, 1-3 tretmana u toku godine u intervalima 7 – 21 dan.

NAČIN DELOVANJA:

ZEAL ubrzava formiranje biomase biljaka kukuruza u ranim fazama razvoja. Optimalna ishrana biljaka i dobra vitalnost useva u fazi pred cvetanje, obezbeđuje odličnu visinu i kvalitet prinosa.

NAPOMENE:

Ne mešati ZEAL sa 4 različita herbicidna proizvoda (ili više). U rezervoarskoj mešavini sa herbicidnim tretmanom koji sadrži bromoksinil ne prekoračiti dozu od 120 g/ha aktivne materije. U rezervoarskoj mešavini sa herbicidnim tretmanom koji sadrži dikambu, pre faze 6 listova, ne prekoračiti dozu od 300 g a.m. dikamba/ha. U mešavini rezervoara sa herbicidnim tretmanom koji sadrži dikambu, posle faze 6 listova, ne prekoračiti dozu od 100 g aktivne materije dikamba /ha. Ne primenjivati u mešavini sa herbicidima koji prekoračuju preporučenu dozu.

Ne primenjivati ZEAL pre faze 4 lista kukuruza. Ne primenjivati tokom najtoplijeg dela dana.

PAKOVANJE:

5 L

**Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo!**

OLIGO BORON

Oligo Boron je tečno đubrivo koje je idealno u prevenciji ili u korekciji nedostataka bora u usevima povrća, voća, cveća i ratarskih kultura.

SASTAV PROIZVODA:

Bor (B) 11 %

- Bor je značajan za klijanje polena, rast i vitalnost polenove cevi;
- Biljkama je potrebno kontinuirano snabdevanje borom tokom vegetacije, jer nije pokretan u biljci, takođe biljke ga ne mogu preraditi iz starih tkiva kao što je slučaj sa azotom, fosforom i kalijumom;
- Nedostaci bora se mogu javiti u uslovima sa malo padavina, kada je aktivnost korena ograničena u alkalnim ili jako kiselim zemljištima. U uslovima velikih padavina, obzirom da je bor pokretan u zemljištu poput nitrata, može se isprati u dublje slojeve zemljišta i tako postati nedostupan za usvajanje.

PRIMENA:

Primenjuje se folijarno i fertirigacijom.

BENEFITI PRIMENE:

- Nadoknađuje usporeni rast i povećava otpornost na sušu i toplotu.
- Nežan je za lisno tkivo

PAKOVANJE:

10 L

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo!



SREDSTVO ZA ISHRANU BILJA KOJE SADRŽI AMINOKISELINE

ARY- AMIN C® je kompleks amino kiselina biljnog porekla, kombinovan sa dodatnim hranljivim elementima. ARY- AMIN C® pomaže optimalnoj sintezi hlorofila, poboljšava efikasnost usvajanja azota i smanjuje abiotičke stresne uslove u nepovoljnim uslovima.

SASTAV PROIZVODA:

Sadrži 7,8% slobodnih aminokiselina, 6,4% ukupnog azota (N), 2,1% organskog azota (N), 0,55% mangana (Mn) i 0,52% cinka (Zn) u obliku rastvora.

PRIMENA:

ARY- AMIN C® koristi za ishranu žitarica, šećerne repe, uljane repice i krompira, na različitim tipovima zemljišta/supstrata, u proizvodnji u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju.

Primenjuje se folijarno u količini od 1 – 4 l/ha po jednoj primeni, rastvorima koncentracije do 0,5 %.

PREPORUKA PROIZVOĐAČA ZA PRIMENU:

1-2 l/ha za žitarice

2-3 l/ha za šećernu repu i krompir

2-4 l/ha za uljanu repicu

Preporuka proizvođača je da se izvrši 1 primena u usevima žitarica, šećerne repe i uljane repice; 2 primene u usevu krompira sa razmak od 14 dana između aplikacija.

Utrošak vode: minimum 100 litara vode po hektaru.

Preparat primeniti tokom intenzivnog vegetativnog rasta biljaka do pojave cvetova ili kada je potrebna stimulacija oporavka biljaka (posle grada, jače pojave bolesti, suše, visokih ili niskih temperatura), kod krompira od početka razvoja krtola do početka cvetanja.

Broj tretiranja u toku godine: 1 – 2 puta u intervalima od 10 – 14 dana ili jednokratno u uslovima stresa. Poslednja folijarna primena treba da bude pri pojavi prvih cvetova. U slučaju primene u proizvodnji lisnatog povrća, poslednja primena treba da bude najmanje 25 dana pre berbe.

NAPOMENA:

Ne treba mešati sa drugim proizvodima čija je reakcija jako kisela ili jako bazna, kao ni sa proizvodima koja sadrže bakar.

PAKOVANJE:

5 L, 20 L

Pre primene sredstva za
zaštitu bilja, obavezno
pročitati uputstvo
za primenu!

ARY-AMIN® C
SREDSTVO ZA ISHRANU BILJA
KOJE SADRŽI AMINOKISELINE

Koristi se za ishranu štikarica, seferne repe, uljane repice i krompira, na različitim tipovima zemljišta/supstrata, u proizvodnji u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju.

Sadrži 7,8% slobodnih aminokiselina, 4,4% ukupnog azota (N), 2,1% organskog azota (N), 0,55% mangana (Mn), 0,26% cinka (Zn) u obliku rastvara.

Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

OBIMNO PROTIVESTI RIZICI PRED UPOTREBU.
Proizvođač: Dadeles Agrosolutions, Španija

Uvoznik i distributor:
DELTA AGRAR D.O.O.
Violeštrina Popovica bb,
11070 Novi Beograd, Srbija,
tel: (011) 201 2200

PAŽljivo pročitati etiketu i pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
ARY-AMIN C je kompletna aminokiselina biljnoj porekla, kombinovan sa dodatnim hranjivim elementima. ARY-AMIN C pomaže optimalnoj sintezi klorofila, poboljšava efikasnost ispoljavanja azota i smanjuje fiziološka stresna uslovi u nepovoljnim uslovima.

PRIMENA: ARY-AMIN C se koristi za ishranu štikarica, seferne repe, uljane repice i krompira, na različitim tipovima zemljišta/supstrata, u proizvodnji u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE: Folijarno u količini od 1 - 4 l/ha po svakom primenu. Sa ukupnom koncentracijom do 0,5 %.

PREPORUKA PROIZVOĐAČA ZA PRIMENU
2-3 l/ha za štikarice
2-3 l/ha za sefernu repu i krompir
2-4 l/ha za uljane repice

H319 - Dovedi do jakе iritacije oka. H412 - Štetno za vodu PAŽNJA
P273 - Izbegavati ispuštanje u okoliš. H302 - Opasni tečnosti. H332 - Opasni prahovi. H334 - Kontaktirajte sa kožom. H335 - Kontaktirajte sa kožom. H373 - Izbegavati ispuštanje u okoliš. H410 - Opasno za životnu sredinu. P201 - Potrebno je upozoriti. P202 - Čitajte etiketu. P273 - Izbegavati ispuštanje u okoliš. P280 - Nosite zaštitnu odjeću. P301 - Ako se proguta, izbacite sadržaj. P302 + P352 - Ako dođe u dodir sa kožom, isperite odmah. P303 + P361 + P353 - Ako dođe u dodir sa kožom, odmah isperite. P304 + P340 - Ako dođe u dodir sa očima, isperite odmah. P305 + P351 + P338 - Ako dođe u oči, pažljivo isperite vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 - Sakupiti priloženi sadržaj. P501 - Odložite sadržaj u ambalazi estere za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada, u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim ili međunarodnim propisima.

Preporuča proizvođač da se izbjegne primena u uslovima izuzetno visoke temperature i/ili visoke vlažnosti. U slučaju primene u uslovima izuzetno visoke temperature i/ili visoke vlažnosti, treba koristiti dodatnu vodu za razrjeđivanje.

KLJUČNA VOĐE: Primeni ARY-AMIN C sa minimum 100 litara vode po hektaru.

VREME PRIMENE: Tokom intenzivnog vegetativnog rasta biljaka do pojave cvetova ili kada je potrebna stimulacija oporavka biljaka (posle gradnje, jake pljuskove, suše, vjetrova ili drugih temperatura, šteta, krompira od početka razvoja krtica do početka cvjetanja).

Bez ikakvih prepreka primene. 1-2 puta u intervalima od 10 - 14 dana ili jednokratno u uslovima stresa. Potrebna folijarna primena treba da bude pri pojavi prvih cvetova. U slučaju primene u proizvodnji biljnog povrća, poslednja primena treba da bude najmanje 25 dana pre berbe.

Ograničenja u primeni: Ne treba mešati sa drugim proizvodima čija je reakcija jako kisela ili jako bazna, kao ni sa proizvodima koji sadrže bakar.

SDRŽAJ: 5 L (6,15 kg)

DELTA AGRAR

8 925064 009748 6

Praktični saveti za primenu pesticida

Nabavka pesticida

- Sredstva za zaštitu bilja treba kupovati isključivo kod poznatih kompanija koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja i u poljoprivrednim apotekama koje imaju zaposlenog inženjera zaštite bilja koji će vam pomoći oko izbora i upotrebe preparata. Sredstva nikako ne treba kupovati na nedozvoljenim mestima (tezge na pijaci, iz gepeka ili ispod ruke), jer se na pomenutim mestima najčešće prodaju falsifikovani pesticidi po niskim cenama koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja useva.
- Bliže informacije u vezi sa nabavkom i primenom sredstava za zaštitu bilja možete dobiti od naše stručne službe na sledeće telefone: 011/201-2433, 021/4722-608, 023/523-416, 037 / 418-760, 032 / 5377-750.

Skladištenje i čuvanje

Pesticide treba čuvati u dobro zatvorenoj izvornoj ambalaži i u zaključanoj prostoriji, van domašaja dece i nestručnih lica. Prostor u kome se skladište pesticidi treba da bude suv, prozračan i bez prisustva nekih drugih proizvoda (hrana, piće, stočna hrana). Moraju biti odvojeni od zapaljivih i eksplozivnih materijala i izvora paljenja. Temperatura na kojoj se pravilno skladište pesticidi je 5°C-30°C.

Pripremanje preparata za upotrebu

- Pre svake pripreme preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu, koje se nalazi uz svako pakovanje preparata. Naročitu pažnju treba obratiti na preporuke o mešanju preparata i striktno se pridržavati ograničenja, ako takva postoje.

Tečnost za tretiranje se priprema na sledeći način: u manjoj čistoj posudi pomešati odmerenu količinu sredstva za zaštitu bilja sa vodom uz mešanje. Tako ujednačenu masu sipati u rezervoar prskalice do pola napunjen sa vodom. Zatim uz stalno mešanje dodati i preostalu količinu vode. Pri pripremanju rastvora za tretiranje potrebno je nositi zaštitna sredstva za oči, lice, telo kako je propisano za svaki pesticid.

- Kod prskalice koje su snabdevene mešalicom, mešalica mora biti uključena u toku pripreme, kao i u toku tretiranja.
- Ako u toku tretiranja koristite više preparata različitih formulacija, (oblika proizvodnje) postupak mešanja preparata sa malo vode i dodavanje u rezervoar prskalice raditi za svaki preparat pojedinačno. Nikako ne pripremati više preparata istovremeno.

Takođe je važan i redosled dodavanja preparata koji se zajedno primenjuju. Pokazalo se da bi redosled dodavanja preparata trebao da bude sledeći: WP, WG, SL, SC, EC, pri čemu navedene skraćenice znače: **WP-kvašljivi prašak**, **WG-vodotopive granule**, **SL-koncentrat za rastvor**, **SC-koncentrovana supenzija**, **CS-suspenzija**

mikrokapsula i EC-koncentrat za emulziju, sa napomenom da se najbolje mešaju preparati iste formulacije, a probleme možete očekivati kod mešanja WP i EC formulacija.

- Ako uz preparate koristite okvašivač, on se dodaje na kraju pripreme tečnosti za tretiranje.
- Ako uz preparate koristite folijarna đubriva, njih treba dodati na kraju pripreme tečnosti za tretiranje.
- Količina vode za primenu u ratarstvu i povrtarstvu je 200-600 l/ha
- Količina vode za primenu u voćarstvu je 1000-1500 l/ha (veće količine vode se koriste za suzbijanje grinja, kruškine buve, pepelnice

i slično, i u voćnjacima sa većom i gušćom krunom)

- Količina vode za primenu u vinogradarstvu je 1000 l/ha
- Posle svake upotrebe prskalicu dobro oprati rastvorom deterdženta i vode, naročito posle primene preparata na bazi 2,4-D i drugih folijarnih herbicida.

Količina vode za prskanje u litrama										
Konc. %	10	15	20	50	100	200	300	400	500	1000
	Potrebna količina sredstava u g, ml ili cm ³									
0,01	1	1,5	2	5	10	20	30	40	50	100
0,04	4	6	8	20	40	80	120	160	200	400
0,07	7	11	14	35	70	140	210	280	350	700
0,1	10	15	20	50	100	200	300	400	500	1000
0,15	15	22	30	75	150	300	450	600	750	1500
0,2	20	30	40	100	200	400	600	800	1000	2000
0,25	25	38	50	125	250	500	750	1000	1250	2500
0,3	30	45	60	150	300	600	900	1200	1500	3000
0,4	40	60	80	200	400	800	1200	1600	2000	4000
0,5	50	75	100	250	500	1000	1500	2000	2500	5000
1,0	100	150	200	500	1000	2000	3000	4000	5000	10000
1,5	150	230	300	750	1500	3000	4500	6000	7500	15000
2,0	200	300	400	1000	2000	4000	6000	8000	10000	20000

Mere sigurnosti

Za vreme primene pesticida treba sprečiti kontaminaciju bunara, jezera, vodotokova i izvorišta voda radeći na udaljenosti od najmanje dvadeset metara. Pakovanje treba pažljivo otvarati i njime rukovati. Za vreme rada, ne sme se jesti, piti niti pušiti. Ne treba udisati kapljice rastvora niti prašinu. Nošenjem propisane zaštitne opreme (odelo, rukavice, maska, kapa, gumena obuća), treba sprečiti dodir sa kožom i očima, a nakon rada sprovesti mere lične higijene i održavanja zaštitne opreme. Ostatke pesticida ne bacati u kanalizaciju.

Ne sme se prskati po velikoj vrućini i po jakom vetru, kako ne bi došlo do zanošenje sredstava na susedne kulture.

Pravilnik za pružanje mera prve pomoći

Otrov može da uđe u organizam na 3 načina: udisanjem (inhalacijom), gutanjem (ingestijom ili peroralno) i preko kože (perkutano).

Najznačajnija mera u okviru pružanja prve pomoći je **PREKID DALJEG UNOŠENJA OTROVA U ORGANIZAM:**

- U slučaju inhalacije zatrovanog treba izvesti, izneti na čist, svež vazduh. Ako je bez svesti odmah ga postaviti u koma položaj (na jedan bok). Ako je zatrovani prestao da diše primeniti veštačko disanje usta na usta (naravno ne u kontaminiranoj prostoriji, već na čistom vazduhu). Prethodno, ako ima potrebe, očistiti disajne puteve (usta i nos), od eventualnog stranog sadržaja.
- Ukoliko je zatrovani radio bez zaštitne opreme ili je otrov prvenstveno dospelo na otkrivene delove tela, kožu oprati mlakom vodom i sapunom, a oči desetak minuta ispirati običnom, čistom vodom.
- Peroralno uneti otrov odstraniti izazivanjem povraćanja ili ispiranjem želudca. Ova metoda je vrlo jednostavna i primenljiva i kao samopomoć. Ukoliko je otrovani svestan dati mu da pije oko pola litre vode, a zatim draženjem ždrebla i uvule (resice) izazvati povraćanje. Postupak ponavljati dok povraćeni sadržaj ne postane bistar (voda). Nakon dobro ispranog želudca po mogućstvu dati aktivni (medicinski) ugalj, 30-50 g razmućenog u čaši vode, jer on ima izvanrednu sposobnost da vezuje za svoju površinu otrovne materije.

NAKON UKAZANE PRVE POMOĆI ZATROVANOG TREBA ŠTO PRE ODVESTI DO NAJBLIŽE ZDRAVSTVENE USTANOVE. SA SOBOM OBAVEZNO PONETI I ETIKETU SA UPUTSTVOM PESTICIDA KOJI JE IZAZVAO TROVANJE.







U SLUČAJU TROVANJA ZA BLIŽA UPUTSTVA O LEČENJU KONSULTOVATI NACIONALNI CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA:

**VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA,
CRNOTRAVSKA 17, BEOGRAD
TELEFONI: 011/3608-440, 3672-187**

Piktogrami za obeležavanje preparata

Svaka opasna hemikalija mora biti adekvatno obeležena. To podrazumeva da se na ambalaži opasne hemikalije nalazi etiketa sa odgovarajućim grafičkim prikazom (piktogramima opasnosti), koji ukazuje na opasnost, kao i tekstualnim obaveštenjima o opasnosti.

Piktogrami koji se najčešće mogu naći na etiketama preparata su:

Piktogram opasnosti	Reč upozorenja	Tekstualno obaveštenje o opasnosti	Piktogram opasnosti	Reč upozorenja	Tekstualno obaveštenje o opasnosti
	Pažnja	H226, Zapaljiva tečnost i para.		Pažnja	H341, Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata. H351, Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma H361d, Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. H371, Može da dovede do oštećenja organa. H373, Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
	Opasnost	H314, Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. H318, Dovodi do teškog oštećenja oka		Opasnost	H304, Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H360D, Može štetno da utiče na plodnost ili na plod H370, Dovodi do oštećenja organa. H372, Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
	Pažnja	H302, Štetno ako se proguta. H332, Štetno ako se udiše. H312, Štetno u kontaktu sa kožom. H315, Izaziva iritaciju kože. H317, Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319, Dovodi do jake iritacije oka. H335, Može da izazove iritaciju respiratornih organa. H336, Može da izazove pospanost i nesvesticu.		Pažnja	H400, Veoma toksično po živi svet u vodi. H410, Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. H411, Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
	Opasnost	H301, Toksično ako se proguta. H330, Smrtonosno ako se udiše. H331, Toksično ako se udiše.			

Smernice za upravljanje ambalažom od hemijskih sredstava

Zbrinjavanje ambalaže posle upotrebe

• *Ispiranje*

- * Trostruko ispiranje
- * Ispiranje pod pritiskom
- * Integrirano ispiranje

Koja god opcija da se koristi odgovorno ispiranje je u interesu svih koji su uključeni u proces rukovanja sredstvima za zaštitu bilja. Ispiranje osigurava da suvišni ostaci proizvoda ne zaostanu u ambalaži proizvoda nakon upotrebe – osnovni je preduslov za ponovnu upotrebu i dobru ekonomsku kontrolu.

Prazna ambalaža od pesticida (koja se razređuje vodom prilikom primene) ako nije pravilno isprana može zagađivati životnu sredinu i postati potencijalna opasnost po zdravlje ljudi i životinjski svet. Poljoprivredna imanja su najbolje mesto za ispiranje. Poljoprivredni proizvođač ili osoba koja rukuje prskalicom mora da:

- Ispere ambalažu vodom odmah nakon pražnjenja

- Prebaci ispranu tečnost u rezervoar prskalice

Ovim se omogućava odstranjivanje ostataka proizvoda u velikoj meri, pored toga predstavlja dobar način postupanja u poljoprivredi, ima ekonomsku svrhu tako što omogućava potrošaču da maksimalno iskoristi ono što su kupili.

POSTUPAK: *Trostruko ispiranje*

1. Onome ko prazni ambalažu omogućiti da iscedi ambalažu dodatnih 30 sekundi pri pražnjenju.
2. Potom bi trebalo ambalažu napuniti 25-30 posto zapremine vodom, zatvoriti čep i ambalažu protresti (okretati, zarotirati, kotrljati i preokrenuti) tako da voda zahvati čitavu unutrašnju površinu.
3. Zatim tečnost preliti u prskalicu (preporučeno vreme ceđenja je 30 sekundi).
4. Postupak ponoviti barem dva puta ili dok ambalaža nije vidljivo čista.





Odgovornost ispiranja je na svima koji su uključeni u proces rukovanja proizvodima za zaštitu bilja.

Ispiranje pod pritiskom

Oprema za ispiranje pod pritiskom koristi vodu pod pritiskom (obično 3 bara) u obliku statične i rotirajuće štrcaljke i ventila.



Integralno ispiranje



Zakoni i Pravilnici koji regulišu oblast upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom:

- PRAVILNIK O SAĐRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21 od 21. marta 2012)
- ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU, (Sl. glasnik RS br. 36/09)
- ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM, ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Gde god je moguće trebalo bi koristiti opremu za integralno ispiranje. To je metoda koja daje najbolji učinak ispiranja ambalaže i pruža visok stepen sigurnosti za osobe koje njime rukuju. Metoda je brža i od trostrukog ispiranja i od ispiranja pod pritiskom.

Uređaj za integralno ispiranje radi tako što koristi vodu pod pritiskom od 3 do 5 bara, ima

statičnu prskalicu s ventilom koja je ugrađena u ulazni levak rasprskivača. Pritisak vode čisti ambalažu sve dok nema vidljivih ostataka (obično treba 30 sekundi za 15 litara vode). Ostatak za ispiranje se automatski dodaje rastvoru za prskanje.

Prednosti	Nedostaci
Trostruko ispiranje <ul style="list-style-type: none"> • Nije potrebna posebna oprema • Može se koristiti u svim prilikama • Nema troškova 	Trostruko ispiranje <ul style="list-style-type: none"> • Na ostatke utiče tehnika osobe koja izvodi postupak • Potrebno je dodatno radno vreme • Postoji određeni rizik po osobu koja izvodi taj postupak
Ispiranje pod pritiskom <ul style="list-style-type: none"> • Ostaci su ispod 0,01% • Onemogućuje ponovno upotrebljavanje ambalaže (ako se ambalaža probije) • Niski troškovi 	Ispiranje pod pritiskom <ul style="list-style-type: none"> • Potrebne su dodatne radnje • Postoji određeni rizik od ugrožavanja osobe koja sprovodi postupak • Može se koristiti samo za krutu ambalažu • Ispirana tečnost ne dodaje se automatski u rastvor za prskanje.
Integrirano ispiranje <ul style="list-style-type: none"> • Ostaci su ispod 0,01% • Može se koristiti za krutu i prilagodivu ambalažu • Jednostavna upotreba • Uz pravilno korišćenje opreme, zanemarljiv rizik za onog koji radi • Ispirna tečnost se automatski dodaje u rezervoar prskalice 	

Zbrinjavanje prazne ambalaže

1. Praznu ambalažu nakon upotrebe privremeno odložiti na propisano i obezbeđeno mesto, obeležiti natpisom **OPASAN OTPAD**.
2. Opasan ambalažni otpad se predaje ovlašćenom operateru za sakupljanje i zbrinjavanje.

Ovaj katalog je informativnog karaktera.
Molimo Vas da pre upotrebe bilo kog preparata **OBAVEZNO** pročitate priloženo
UPUTSTVO ZA PRIMENU.

BESPLATAN PRIMERAK

www.deltaagrars.rs



PRIČE SA POLJA (<http://blog.deltaagrars.rs/>)



DELTA AGRAR (<https://www.linkedin.com/company/delta-agrar-doo>)



Delta Agrar (<https://www.facebook.com/DeltaAgrar/>)



Delta Agrar (<https://www.youtube.com/user/DeltaAgrarSrbija>)




PRIČE SA POLJA (<https://www.instagram.com/pricesapolja/>)

DELTA AGRAR



www.deltaagrars.rs



Vladimira Popovića 8a
11070 Novi Beograd, Srbija

DELTA
AGRAR



www.deltaagrars.rs